

هر آمپول متوکاربامول ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر / ۱۰ میلی لیتر است.
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
وجود هرگونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری های دیگر.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

دوز معمول در بزرگسالان:

۱- شل کننده عضلات: تزریق به صورت داخل وریدی یا داخل عضله به مقدار ۱ تا ۳ گرم به مدت سه روز و در صورت نیاز ۴۸ ساعت بعد تکرار شود.

۲- درمان تکمیلی کزاز: تزریق داخل وریدی به میزان ۱ تا ۲ گرم به صورت تزریق مستقیم و یا انفوزیون وریدی به میزان ۱ تا ۲ گرم (یک دوز شروع شوند تا ۳ گرم تجویز می شود) می باشد که هر ۶ ساعت. تا زمانی که لوله گذاری در دستگاه گوارش انجام پذیرد تکرار می شود.

- دوز نهایی بیش از ۳ گرم در روز تجویز نگردد. درمان با این دارو به جز در بیماری کزاز بیشتر از ۳ روز متوالی ادامه نیابد.

- دارو توسط محلول تزریقی سدیم کلراید و یا دکستروز ۵٪ رقیق گردد و حجم نهایی بیش از ۲۵۰ میلی لیتر نباشد و محلول رقیق شده در دمای مناسب نگهداری شود (از یخ زدگی محافظت شود).

- بیمار در طول تزریق وریدی و پس از اتمام آن به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دراز کشیده و استراحت نماید.

دوز معمول در کودکان:

شل کننده عضلانی: سلامتی و اثر بخشی دارو در کودکان زیر ۱۲ سال اثبات نگردیده است.

درمان تکمیلی کزاز: به صورت وریدی 15mg/kg بر مبنای وزن بدن و یا ۵۰۰ میلی گرم به ازای هر مترمربع از سطح بدن و در صورت نیاز هر ۶ ساعت. دوز نگهدارنده باید به صورت انفوزیون وریدی یا از طریق لوله گذاری با مقدار کافی از مایعات انجام پذیرد.

نکته: دوز مصرفی در کودکان نباید از ۱/۸ گرم به ازای هر متر مربع از سطح بدن برای ۳ روز متوالی بیشتر شود.

منع مصرف:

حساسیت به گلی بنکلامید، دیابت ملیتوس نوع ۱ یا کتواسیدوز دیابتی با یا بدون کما، مصرف همزمان با بوسنتان.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

۱- متوکاربامول نباید در خانم های باردار به ویژه در سه ماهه اول بارداری و حتی کسانی که قصد بارداری دارند مصرف گردد و لیکن در نهایت پزشک در خصوص منفعت در مصرف و یا خطراتی که جنین را تهدید می کند تصمیم گیری نماید.

۲- متوکاربامول بر اساس دسته بندی FDA گروه C در دوران بارداری است.

شیر دهی: در شیردهی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثر درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته هستند اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

۱- گیجی، بی حالی، کاهش ضربان قلب، ضعف عضلانی، نیستگموس، گرگرفتی صورت.

۲- در محل تزریقی ممکن است رنگ پریدگی پوست و التهاب عروق دیده شود. همچنین واکنش‌های حساسیتی مانند تب، التهاب ملتحمه چشم، احتقان بینی و لوکوپنی نیز دیده شده است. در برخی موارد ممکن است فرد دچار تاری دید و دوبینی گردد.

هشدارها:

در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر با پزشک مشورت شود:

- ۱- در بیماران مبتلا به صرع با احتیاط مصرف شود.
- ۲- عملکرد کلیه در درمان بیش از سه روز بررسی شود.
- ۳- در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس که داروی پیریدوستیگمین مصرف می‌کنند با احتیاط تجویز شود.
- ۴- در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود زیرا PEG ۳۰۰ موجود در آمپول موجب سمیت کلیوی خواهد شد.
- ۵- تزریق زیر جلدی توصیه نمی‌گردد.
- ۶- در تزریق مستقیم وریدی سرعت تزریق بیش از ۳ میلی‌لیتر در دقیقه نباشد.
- ۷- در تزریق عضلانی ۵ میلی‌لیتر در هر عضله سرینی تزریق شود.

تداخل دارویی:

مصرف همراه با الکل و یا درمان‌های تضعیف‌کننده‌های دستگاه عصبی مرکزی SNC با احتیاط تجویز گردیده و تعدیل دوز یک یا هر دو دارو انجام پذیرد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

