قرص

# آریپیپرازول ۵ ، ۱۰ میلی گرم

Tablet

# Aripiprazole 10 , 5 mg

**این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.**

## راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

۱- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر مواد نظیر غذاها، رنگ ها و یا مواد محافظ.

۲- در صورت بارداری یا شیردهی.

۳- استفاده در افراد مسن و کودکان.

۴- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً الکل، داروهای کنترل کننده فشار خون ، کاربامازپین یا سایر القاء کننده های 4A3PYC، داروهای محرک یا مهـــار کننده سیستم عصبی مرکزی، کتوکونازول یا ســـایر مهار کننده های 4A3PYC ، فلوکستین یا سایر مهارکننده های 6D2PYC ، داروهایی با اثرات آنتی کولینرژیک.

۵- ابتلا به سایر بیماریها و مشکلات پزشکی نظیر سندرم نورولپتیک بدخیم (SMN) ، بیماریهای قلبی- عروقی ، بیماریهای عروق مغزی ، اختلال در پالسهای الکتریکی قلب، مشکلات قلبی ، کاهش حجم مایعات بدن ، بیماریهای ایسکمی قلبی، حمله قلبی، دیابت ملیتوس یا وجود عوامل زمینه ساز بروز دیابت ملیتوس.

## مقدارو نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، دوز معمول دارو بصورت زیر است:

**دوز معمول در بزرگسالان:**

- مانیای دوقطبی : ۳۰ میلی گرم خوراکی یکبار در روز. به عنوان دوز شروع درمان، درمان نگهدارنده بیش از ۶ هفته مورد مطالعه قرار نگرفته است.
- شیزوفرنی : ۱۵- ۱۰ میلی گرم خوراکی یکبار در روز بدون غذا. افزایش مقدار مصرف باید با حداقل ۲ هفته فاصله صورت گیرد .
- در صورت تجویز همزمان با داروهای زیر تنظیم مقدار مصرف ضروری است:

۱- داروهای مهار کننده 4A3PYC نظیر کتوکونازول

۲- داروهای مهار کننده 6D2PYC نظیر کینیدین، فلوکستین یا پاروکستین

۳- داروهای القا کننده 4A3PYC نظیر کاربامازپین

**دوز معمول در کودکان:**

- سلامتی و کارایی مصرف این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

**دوز معمول درسالمندان :**

- دوز معمول مصرف در سالمندان همانند دوز معمول در بزرگسالان می باشد.

**دوز فراموش شده:**

- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید ، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعد فرا رسیده است، دوز فراموش شده رامصرف نکرده و از دو برابر کردن مقدار بعدی مصرف خودداری کنید.

این دارو را می توان همراه یا بدون همراهی با غذا مصرف کرد.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

**بارداری:**

مطالعات کافی و کنترل شده ای در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری صورت نپذیرفته است، استفاده از این دارو باعث بروز برخی عوارض ناخواسته در حیوانات می گردد. این دارو از نظر مصرف در بارداری گروه C می باشد.

**شیردهی:**

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

## عوارض جانبی :

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، لیکن در صورت بروز هر یک از آن‌ها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

**عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

**عوارض شایع :**

سندرم اکستراپیرامیدال ( اختلال در تکلم ، عدم تعادل، لرزش و سختی عضلات، حرکات غیر ارادی خصوصا در صورت گردن یا پشت)

**عوارض با شیوع کم :**

افزایش فشارخون

**عوارض نادر :**

سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS) (تشنج، مشکلات تنفسی ، افزایش ضربان قلب، تب بالا، افزایش یا کاهش فشارخون ، افزایش تعریق، عدم کنترل مثانه ، سختی شدید عضلات ، رنگ پریدگی و خستگی )، تشنج ، دیسکنزیای تاخیری (جمع کردن لبها ، پف کردن گونه ها، حرکات سریع یا کرم مانند زبان، حرکات غیر قابل کنترل جویدن، حرکات غیر قابل کنترل دست‌ها و پاها)

– عوارض با شیوع نامعلوم که در بالین مشاهده شده است:

واکنشهای حساسیتی، آنژیوادم (ورم صورت، پلکها ، لبها، زبان و ...) ، اسپاسم حنجره، خارش و کهیر.

**عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی احتیاج به مراقبت پزشکی دارند:**

**عوارض شایع :**

آشفتگی و بیقراری ، آکاتزی، اضطراب ، سستی ، یبوست، سوء هاضمه ، سردرد، بیخوابی ، سبکی سر، تهوع ، راش ، حالت خواب آلودگی ، استفراغ، افزایش وزن

– عوارض با شیوع کم:

جراحتهای اتفاقی ، تاری دید، سرفه، افزایش بزاق، درد و تورم عضلات ، تب ، ادم محیطی ( ورم صورت، بازوها، دست‌ها و پاها ، افزایش یا کاهش سریع وزن ، ...) گلودرد، رینیت، لرزش .

## هشدارها :

۱– به استثنای شرایط خاص ، این دارو در مورد زیر نبایستی مصرف گردد:

حساسیت به آریپیپرازول

۲– در صورت وجود بیماری‌ها و مشکلات زیر ارزیابی منافع مصرف در مقابل مضرات آن ضروری می باشد:

سابقه مصرف و وابستگی به الکل یا سایر مواد مخدر، زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر، سابقه تشنج یا شرایطی که آستانه بروز تشنج را کاهش می دهند، سابقه یا احتمال ابتلا به پنومونی تنفسی ، بیماریهای قلبی – عروقی، بیماریهای عروق مغزی، اختلال در پالسهای الکتریکی قلب، دهیدراسیون، نارسایی قلبی، کاهش حجم پلاسما، سابقه مشکلات ایسکمی قلبی یا حملات قلبی، شرایطی که باعث افزایش دمای بدن می شوند نظیر قرار گرفتن در محیط بسیار گرم یا انجام حرکات ورزشی شدید، دیابت ملیتوس یا وجود عوامل زمینه ساز بروز دیابت نظیر چاقی و زمینه خانوادگی ابتلا به دیابت، سابقه سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS)

۳– بیماران باید از لحاظ بروز علائم ابتدایی دیسکنزیای تاخیری به دقت و در فواصل منظم تحت نظر باشند (خصوصا افراد مسن و کسانی که به مدت طولانی مقادیر بالای دارو را مصرف می کنند)، در صورت بروز علائم قطع مصرف توصیه می گردد.

۴– بیمارانی که احتمال خودکشی در آن‌ها بالا می باشد باید به دقت تحت نظر قرار گیرند. (تجویز کمترین تعداد مورد نیاز دارو برای جلوگیری از احتمال سوء مصرف توصیه می شود.)

۵– از آنجائیکه این دارو می تواند بر سطح قند خون اثر کند لذا بیماران باید از لحاظ بروز علائم افزایش قند خون نظیر عطش بیش از حد ، تکرر ادرار ، افزایش اشتها، ضعف و ... تحت نظر باشند.

۶– در طول درمان با این دارو بیمار بایستی بطور مرتب از نظر روند بهبودی مورد بررسی قرار گیرد.

۷– کنترل و ارزیابی منظم شبکیه چشم توصیه می گردد.

۸– این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی ، اختلال در تصمیم گیری ، عدم تمرکز و ... گردد، لذا به هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به دقت و هوشیاری دارند احتیاط نمایید .

۹- به علت احتمال افت فشار خون به آهستگی از حالت نشسته یا دراز کشیده به حالت ایستاده تغییر وضعیت دهید.
۱۰- از قرار گرفتن در معرض حرارت زیاد و یا کم آبی به علت ایجاد نقص در تنظیم دمای بدن توسط این دارو ، پرهیز نمایید.
۱۱- از مصرف الکل و نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نمایید.
۱۲- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کرده و بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
۱۳- در خصوص کلیه داروهایی که مصرف می کنید(چه با نسخه و چه بدون نسخه پزشک) حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

## تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان داروهای زیر با قرص آریپیپرازول ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید:
الکل، داروهای کنترل کننده فشار خون آنتاگونیست رسپتور آلفا۱- آدرنرژیک ( نظیر پرازوسین، ترازوسین، ...) کاربامازپین یا سایر داروهای القاء کننده 4A3PYC ، داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی، داروهای مهار کننده سیستم عصبی مرکزی، داروهای مهار کننده 4A۳PYC نظیر ایتراکونازول و کتوکونازول، داروهای مهار کننده 6D2PYC نظیر فلوکستین ، پاروکستین یا کینیدین، داروهایی که فعالیت آنتی کولینرژیک دارند.

## شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری:۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰