برگه راهنمای دارویی

مترونیدازول قرص روکشدار ۲۵۰ و۵۰۰ میلی گرم

Metronidazole F.C. Tablet 250&500mg

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

- **راهنمایی های عمومی :**

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه
- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر
- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به بیماری های دیگر
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف در کودکان و افراد سالخورده

- **نحوه و مقدار مصرف دارو:**

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می گردد. دوز معمول دارو به صورت زیر است:

دوز معمول در بزرگسالان:

- **درمان عفونت های بی هوازی:** ۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (این مقدار می تواند حداکثر تا یک گرم افزایش یابد)، هر ۶ ساعت یکبار و به مدت هفت روز یا بیشتر ادامه یابد.
- **بیماریهای روده:** ۵۰۰ میلی گرم چهار بار در روز مصرف شود.
- **التهاب معده هلیکوباکتر پیلوری:** ۵۰۰ میلی گرم، سه بار در روز به همراه بیسموت ساب سیترات و سایر آنتی بیوتیک های خوراکی مثل آمپی سیلین یا آموکسی سیلین به مدت یک تا دو هفته مصرف گردد.
- **واژینیت باکتریایی:** ۵۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به مدت ۲ روز مصرف شود.
- **آمیبیازیس:** ۵۰۰ میلی گرم تا ۷۵۰ میلی گرم، سه بار در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز مصرف شود.
- **آبسه کبد آمیبی:** ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی گرم، سه بار در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز مصرف شود.
- **بالانتیدیازیس:** ۷۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت ۵ تا ۶ روز مصرف شود.
- **ژیاردیازیس:** ۲ گرم یک بار در روز به مدت ۳ روز و یا ۲۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت ۵ تا ۷ روز مصرف شود.
- **واژینیت تریکومونایی:** ۲ گرم به صورت تک دوز یا ۱ گرم دو بار در روز به مدت یک روز، ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت هفت روز و یا ۲۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت هفت روز مصرف شود.

دوز معمول در کودکان:

- **عفونت های بی هوازی:** ۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، هر ۶ ساعت و یا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۸ ساعت مصرف شود.
- **عفونت آمیبی:** ۱۱/۶ تا ۱۶/۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳ بار در روز به مدت ۵ روز مصرف شود.
- **بالانتیدیازیس:** ۱۱/۶ تا ۱۶/۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳ بار در روز به مدت ۵ روز مصرف شود.
- **ژیاردیازیس:** ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳ بار در روز به مدت ۵ تا ۷ روز مصرف شود.
- **عفونت تریکومونایی:** ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳ بار در روز به مدت ۷ روز مصرف شود.
- **دوز فراموش شده**: اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوردی آن را مصرف کنید ولی چناچه زمان مصرف نوبت بعد فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.

– مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

– از آنجائیکه مطالعات کافی و کنترل شده ای از مصرف این دارو در زنان باردار صورت نگرفته است، لذا مصرف آن در دوران بارداری باید طبق نظر پزشک صورت پذیرد. مصرف دارو در سه ماهه اول بارداری توصیه نمی شود. (این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در رده B می باشد)

- با توجه به ترشح این دارو در شیر، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. در صورت نیاز ضروری به مصرف دارو شیردهی را قطع نموده و یک تا دو روز پس از قطع مصرف، مجدداً شیردهی را آغاز نمایید.

- عوارض جانبی :

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارضی که شیوع کمتری دارند:

نوروپاتی محیطی، حملات صرع(معمولاً در صورت مصرف دوز بالایی از دارو رخ می دهد)، سمیت عصبی، حساسیت فوق العاده (راش های پوستی، کهیر)، لوکوپنی، پانکراتیت، ترومبوسیتوپنی، (خونریزی غیر معمول، مدفوع قیری رنگ، مشاهده خون در ادرار یا مدفوع، ایجاد لکه های کوچک قرمز روی پوست)، ترومبوفلبیت، عفونت قارچی ناحیه واژن.

عوارضی که تنها در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

مشکلات عصبی، ناراحتی های دستگاه گوارش

عوارضی که به ندرت رخ می دهند:

تغییر در حس چشایی، خشکی دهان، ادرار تیره رنگ

- **هشدارها :**
- دوره درمان را تکمیل نمایید.
- دارو را در زمان تعیین شده مصرف نمایید.
- به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو را به همراه وعده غذایی میل نمایید.
- در صورت عدم مشاهده روند بهبودی در طی چند روز، به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در طی دوره درمان، حداقل ۳ روز پس از قطع مصرف این دارو از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید.
- در صورت تداوم احساس خشکی دهان به مدت بیش از دو هفته به دندانپزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بروز سرگیجه و احساس سبکی سر، احتیاط کنید.
- پس از درمان ژیاردیازیس، به منظور اطمینان از برطرف شدن کامل عفونت به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر سنجیدن منافع دارو در مقابل مضرات آن ضروری است:
- بیماریهای ارگانیک سیستم عصبی مرکزی مانند صرع، مشکلات خونی یا وجود سابقه ای از آن، نارسایی کبدی، حساسیت زیاد به مترونیدازول و عفونت قارچی
- دارو ممکن است موجب خواب آلودگی شود.
- **تداخلات دارویی:**

در صورت مصرف داروهای زیر ، ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید:

الکل، داروهای ضد انعقاد خون، کومارین یا مشتقات ایندانديون،سایمتیدین، داروهای اعصاب، فنیتوئین، فنوباربیتال، دی سولفیرام و لیتیم

- شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت و در جعبه اصلی نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

References:

USP DI 2007

تماس مشتری: (021) 77141860
CRM@chemidarou.com