قرص

رپاگین® (رپاگلینايد) ۰/۵، ۱ و ۲ میلی گرم

Tablet

Repagain® (Repaglinide) 0.5,1 and 2 mg

هرقرص حاوی رپاگین® (رپاگلینايد) ۰/۵ ، ۱ و ۲ میلی‌گرم است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:

۱- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

۲- در صورت مصرف سایر داروها خصوصا داروهـــای ضد قارچ (کتوکونازول و میکونازول)، داروهـــای ضد میکروب (اریترومایسین)، ریفـــامپین، باربیتورات ها، کاربامازپین، کلاریتروم‌ـــایسین، جم فیبروزیل، داروهـــای ضد التهـــاب غیر استروئیدی، سالیسیلات ها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل، کومـــارین ها، پروبنسید، مهار کننده های مونوآمینواکسیداز، مهارکننده هـــای گیرنده های بتا، تیازیدها، سایردیوریتک ها، کورتیکواستروئیدها، فنوتیازینها، ترکیبات استروئیدی، استروژن ها، کنتراسپتیوهای خوراکی، فنی توئین، اسید نیکوتنیک، سمپاتومیمتیک ها، مهارکننده های کانال های کلسیم و ایزونیازید.

۳- در صورت ابتلاء به سایر **بیماری ها خصوصاً** کتواسیدوزدیابتیک و بیماری های کبدی.

۴- علائم هیپوگلیسمی را بشناسید و راه درمان آن را یاد بگیرید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

در بیمارانی که قبلاً تحت درمان نبوده اند یا آنهایی که مقدار HbAIC کمتر از ۸٪ دارند دوز اولیه مقدار ۰/۵ میلی گرم با هر غذا خواهد بود. در بیمارانی که قبلا با سایر داروهای ضد قند خوراکی درمان می شده اند یا کسانی که مقدار HbAIC بزرگتر یا مساوی ۸٪ دارند دوز اولیه ۱ تا ۲ میلی گرم با هر وعده غذا خواهد بود. تنظیم دوز با اندازه گیری قند خون انجام می گیرد. دوز توصیه شده می تواند بین ۴ – ۰/۵ میلی گرم با هر وعده غذا متفاوت باشد. دوز دارو با نوع غذایی که بیمار مصرف می کند قابل تغییر است. حداکثر دوز توصیه شده این دارو ۱۶ میلی گرم در روز می باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو از نظر طبقه بندی FDA در رده C می باشد. لذا در دوران بارداری بایستی با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار دارو مصرف شود. این کار باید حتما با تشخیص و نظر پزشک متخصص باشد. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض مشاهده شده با مصرف این دارو عبارتند از: افت قند خون، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سینوزیت، رینیت، برونشیت، تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، فقدان ترشح اسید، درد عضلانی، درد کمر، سردرد، پارستزی، درد در قفسه سینه، عفونت دستگاه ادراری، مشکلات در دندان ها، آلرژی، آریتمی های خطرناک و ایسکمی قلبی خطرناک.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو به همراه انسولین NPH به هیچ وجه توصیه نمی شود.

۲- مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده ی این دارو می تواند باعث ایجاد شوک هیپوگلیسمی شود، لذا به مقدار مصرف دارو توجه کافی داشته باشید.

۳- در صورت عدم مصرف وعده غذایی دوز دارو را مصرف نکنید و در صورت اضافه نمودن یک وعده یک دوز دارو اضافه نمایید.

۴- در صورت ایجاد شرایط استرس نظیر تب، ضایعات بدنی، عفونت ها یا جراحی موضوع را برای تنظیم دوز دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

۵- همکاری لازم را برای رعایت رژیم غذایی توصیه شده از جانب پزشک بنمایید. موفقیت درمان شما به مقدار زیادی به این موضوع بستگی دارد.

۶- دارو را ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل ازغذا مصرف کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصا داروهای ضد قارچ داروهای ضد میکروب (اریترومایسین)، ریفامپین، باربیوتورات ها، کاربامازپین، کلاریترومایسین، جم فیبروزیل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سالیسیلات ها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل، کومارین ها، پروبنسید، مهار کننده های مونوآمینواکسیداز، مهار کننده های گیرنده های بتا، تیازیدها، سایر دیورتیک ها، کورتیکواستروئیدها، فنوتیازین ها، ترکیبات تیروئیدی، استروژن ها، کنتراسپتیوهای خوراکی، فنی توئین، اسید نیکوتینیک، سمپاتومیمتیک ها، مهارکننده های کانال های کلسیم و ایزونیازید موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده ی دارو بلافاصله بیمار را به مرکز فوریت های مسمومین انتقال دهید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری:۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران