

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن، آسپیرین یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- ۲- در صورتی که هر گونه داروی دیگری را مصرف می‌کنید یا قصد استفاده از هر گونه داروی بدون نسخه را دارید.
- ۳- در صورت ابتلاء به هر گونه بیماری خصوصاً نارسایی کبدی یا کلیوی، زخم معده، افزایش فشار خون، آریتمی قلبی یا سایر بیماری‌های قلبی - عروقی، تشنج، اختلالات خونی، مشکلات انعقاد خون، بیماری‌های اضطرابی، هپاتیت ویروسی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو در افراد بزرگسال بدین صورت می‌باشد:
- با توجه به اینکه کپسول‌های دلتافن® حاوی ۳ ماده موثره (استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن) هستند دوز دارو باید با توجه به هر ۳ ماده موثره تنظیم شود. در درمان دردهای خفیف تا متوسط تعداد یک کپسول هر ۴-۶ ساعت همراه یا بعد از غذا مصرف می‌شود.

توجه:

مصرف بیش از حد استامینوفن می‌تواند باعث سمیت کبدی و کلیوی شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مطالعات دقیق و کنترل شده‌ای در زنان باردار در مورد اثرات مصرف این دارو صورت نگرفته است. به همین دلیل مصرف این دارو در دوران بارداری با پستی با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضرات آن صورت گیرد و این کار باید حتماً با تشخیص و نظر پزشک متخصص باشد، مصرف دارو در نیمه دوم بارداری توصیه نمی‌شود، مصرف این دارو در مادران شیرده نیز توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک خود مشورت کنید.
عوارض این دارو مجموعه‌ای از عوارضی است که ممکن است توسط هریک از مواد موثره این دارو ایجاد شود. این عوارض عبارتند از: آئوزینوفیلی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پانسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، راش‌های پوستی، آسیب کبدی و کلیوی، آسم، تحریک دستگاه گوارش، تحریک سیستم اعصاب مرکزی، تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، بی‌خوابی، سر درد، تشویش، مشکلات قلبی - عروقی، خونریزی‌های گوارشی، لرزش، طپش قلب، تشنج و پانکراتیت، هیپرگلیسمی، هیپوکلسمی، نارسایی کلیه، آنمی، کولیک کلیه (درد در سمت پشت و پهلوها)، واکنش‌های حساسیتی.

هشدارها:

- ۱- این دارو را فقط در صورت تجویز پزشک و طبق دستورات پزشک مصرف نمایید.
- ۲- از افزایش ناگهانی دوز دارو بدون مشورت با پزشک خود جدا خودداری نمایید.
- ۳- در صورت داشتن سابقه هر گونه تشنج یا تحت درمان بودن با داروهای ضد تشنج حتماً پزشک خود را مطلع فرمایید.
- ۴- مصرف داروها و غذاهای حاوی کافئین را به همراه این دارو محدود نمایید.
- ۵- در کودکان زیر ۱۲ سال مصرف دارو توصیه نمی‌شود.

- ۶- در صورت گلو درد شدید و ادامه دار (بیشتر از ۲ روز) همراه تب و سردرد و تهوع و استفراغ بعد از مصرف دارو درمان را متوقف و با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۷- دوز تجویز شده توسط پزشک را خود سرانه تغییر ندهید.
- ۸- در صورت بهتر نشدن علائم بیماری پس از ۴-۵ روز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۹- مصرف بیش از ده روز برای تسکین درد، بیش از ۳ روز برای بهبود تب مگر با تجویز پزشک توصیه نمی‌شود.
- ۱۰- در صورت مشاهده علائم شبه آنفولانزا همراه با راش جلدی سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
- ۱۱- احتمال حساسیت به نور آفتاب وجود دارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً آسپیرین و دیگر ضد التهاب‌های غیر استروئیدی، تنظیم‌کننده‌های چربی خون، باکلوفن، فرآورده‌های حاوی الکل، داروهای ضد آریتمی، سیپروفلوکساسین، انوکساسین، افلوکساسین، ریفامپین، آلوپورینول، لیتیم، فنی تئوین، کاربامازپین، فنوباریتال، پریمیدون، کورتیکو استروئیدها، تربینافین، سایمتیدین، کنتراستپتوهای خوراکی، کلوزاپین، فنیل پروپانولامین، تتوفیلین، لاموتریزین، پروپرانولول، وارفارین و پروبنسید، دیگوسکین، سیکلوسپورین، والپروئیک اسید، تریامترن، مهارکننده‌های آنژیوتانسین، ضد انعقادها، ترومبولیتیک‌ها، مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (فورازولیدون، پروکاربازین، سلژیلین)، داروهای محرک سیستم عصب مرکزی موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد لازم، حتی اگر علامتی نداشتید بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری شود.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

