

هر قرص حاوی ۲۰ میلی گرم رابپرازول است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:

۱- سابقه حساسیت به رابپرازول و سایر بنزیمیدازول ها و یا هریک از اجزا متشکله دارو.

۲- سابقه بیماری های کبدی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان:

در درمان برگشت اسید معده به مری ۲۰ میلی گرم یکبار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته (در صورت عدم بهبودی تکرار یک دوره ۸ هفته ای دیگر توصیه می شود)، دوز نگهدارنده نیز در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری ۲۰ میلی گرم یک بار در روز می باشد، در درمان زخم های دوازدهه ۲۰ میلی گرم یکبار در روز به مدت چهار هفته (در صورت عدم بهبودی تکرار یک دوره چهار هفته ای دیگر توصیه می شود)، همچنین در درمان سندرم زولینگر-الیسون به میزان ۶۰ میلی گرم یک بار در روز مصرف می گردد که ممکن است با توجه به نیاز بیمار تا میزان ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز و یا ۶۰ میلی گرم دوبار در روز به مدت یک سال تجویز گردد.

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه نمایید:

هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.

این دارو باید به طور کامل بلعیده شود (از جویدن، نصف کردن و یا شکستن قرص ها خودداری نمایید).

مصرف این دارو همزمان با آنتی اسیدها بلامانع می باشد.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

منع مصرف:

حساسیت به استامینوفن، مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، نارسایی کبدی شدید یا بیماری کبد اکتیو شدید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو رده B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی بارداری تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد. این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

مصرف در شیردهی:

علی رغم این که اطلاعاتی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر وجود ندارد اما از آنجایی که مطالعات انجام گرفته بیانگر ترشح این دارو در شیر موش های صحرایی می باشد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

عوارض جانبی:

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شیوع کم: آپنه (تنفس منقطع)، تشنج، کم خونی، آگرانولوسیتوز (لرز، تب، گلودرد، ضعف و خستگی غیر معمول)، لکوپنی یا نوتروپنی (زخم و درد در دهان)، ترومبوسیتوپنی (کبودی یا خونریزی غیر معمول)، خون در ادرار، هیپاتیت (زردی چشم‌ها و پوست).

۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: سردرد.

شیوع کم یا نادر: احساس ضعف، یبوست، احساس عدم تعادل، سوء هاضمه، نفخ، تهوع و استفراغ، احساس مور مور شدن دست‌ها و پاها، خارش، خواب آلودگی و درد شکم.

موارد احتیاط:

- ۱- تجویز این دارو در بیمارانی که دارای بیماری کبدی خفیف تا متوسط می‌باشند باید با احتیاط صورت گیرد.
- ۲- از آنجایی که مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می‌باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:
از آنجایی که این دارو باعث افزایش مقدار Hp معده می‌شود، همزمانی مصرف رابپرازول غلظت خونی کتوکونازول را کاهش و غلظت خونی دیگوکسین، سیکلوسپورین و وارفارین را افزایش می‌دهد.
مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل فرمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

