

برگه راهنمای دارویی

Memantin F.C. Tablet 5,10 mg

ممانتین قرص روکش دار ۵ و ۱۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی‌های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً آمانتادین، کتامین، دکسترومتورفان، هیدروکلروتیازید، تریامترن، سایمتیدین، کینیدین، نیکوتین، مهارکننده‌های آنزیم کربنیک آنهیدراز و سدیم بی‌کربنات.
- در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها خصوصاً بیماری‌های کلیوی.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید، ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده بود مقدار دوز بعدی را دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
- دوز موثر ممانتین ۲۰ میلی گرم در روز می باشد.
 - دوز اولیه توصیه شده برای این دارو ۵ میلی گرم یکبار در روز می باشد. این دوز تا رسیدن به مقدار ۲۰ میلی گرم در روز بایستی به صورت هفتگی ۵ میلی گرم افزایش یابد.
 - ممانتین را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کرد.
 - برای بیماران با نقص عملکرد کلیوی نیاز به تنظیم دوز است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک متخصص و با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار آن. از نظر دسته بندی FDA در گروه B قرار می گیرد.

از لحاظ مصرف در دوران شیردهی مطالعات کاملی درباره این دارو انجام نشده است ولی با توجه به ترشح اغلب داروها از شیر مادر مادران شیرده می بایستی در دوره مصرف این دارو در ایام شیردهی پزشک خود را در جریان قرار دهند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض مشاهده شده با مصرف این دارو عبارتند از: چاقی، درد، افزایش فشار خون، سرگیجه، سردرد، یبوست، تهوع، درد کمر، گیجی، بی خوابی، توهم، سرفه، لرزش، بی اختیاری ادرار، اسهال، برونشیت، عفونتهای دستگاه ادراری، علائم شبه آنفولانزا، افسردگی، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی، ادم محیطی، درد مفاصل.

هشدارها:

- ۱- کلیه داروها و موادی که بتوانند pH ادرار را قلیایی کنند مقدار دفع این دارو را کاهش داده و باعث افزایش سمیت آن می‌شوند لذا به هنگام مصرف این دارو حتی الامکان از مصرف غذاهای گیاهی، مهار کننده‌های آنزیم کربنیک آنهیدراز، سدیم بی کربنات و سایر داروهایی که ادرار را قلیایی می‌کنند خودداری کنید. در ضمن در صورت بروز عفونتهای ادراری و یا اسیدوز کلیوی موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۲- در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد توصیه شده دارو، بلافاصله بیمار را به بیمارستان مسمومین انتقال دهید یا موضوع را به اطلاع پزشک برسانید.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف سایر داروها خصوصا "آماتنادین، کتامین، دکسترومتورفان، هیدروکلروتیازید، تریامترن، سایمتیدین، کینیدین، نیکوتین، مهارکننده های آنزیم کربنیک آنهیدراز و سدیم بی کربنات موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

تماس مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰

CRM@chemidarou.com