قرص و قرص انتریک کوتد

ناپروکسن ۲۵۰ میلی‌گرم و ۵۰۰ میلی گرم

Tablet & E.C.Tablet

Naproxen 250 , 500 mg

هر قرص حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم ناپروکسن است و هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم ناپروکسن (انتریک کوتد) است.
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
۱- سابقه حساسیت به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و آسپیرین.
۲- سابقه ناراحتی معده و زخمهای گوارشی.
۳- سابقه حملات آسم- آنژیوادم- کهیر- رینیت آلرژیک.
۴- سابقه نارسایی کبدی- کلیوی- خونی- قلبی(فشارخون).

مقدارو نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است :

دوز معمول در بزرگسالان:

درمان روماتیسم، استئوآرتریت و التهاب همراه با درد ستون مهره ها در هنگام حرکت؛ ۳۷۵ یا ۵۰۰ میلی گرم دوبار در روز صبح و عصر.
درمان التهاب و درد و دیسمنوره : ابتدا ۵۰۰ میلی گرم و سپس ۲۵۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت در صورت نیاز.
درمان نقرس : ابتدا ۷۵۰ میلی گرم و سپس ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت تا فروکش کردن حمله ها

دوز معمول در کودکان:

در درمان روماتیسم: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۲ دوز منقسم.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در ۳ ماهه آخر حاملگی منع مصرف دارد . از لحاظ تقسیم بندیFDA در گروه C قرار دارد. این دارو در شیر مادر ترشح می شود و در دوران شیردهی منع مصرف دارد . در صورت لزوم به تجویز این دارو از شیر دادن به نوزاد اجتناب شود .

عوارض جانبی:

در طول مصرف هر دارو ممکن است عوارض ناخواسته ای ایجاد شود. اگر چه این عوارض به ندرت مشاهده می شوند اما در صورت اتفاق افتادن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند. در صورت مشاهده هرکدام از عوارض ذیل با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
شایع ترین عارضه این دارو مانند سایر داروهای گروهNSAID's اختلالات گوارشی شامل ناراحتی های معده و روده می باشد. این عوارض معمولا خفیف و قابل برگشت می‌باشند اما در برخی بیماران احتمال ایجاد زخم‌های گوارشی و خون ریزی های شدید گوارشی وجود دارد.
عوارض سیستم عصبی مرکزی شامل سردرد، سرگیجه، گیجی، وزوز گوش، عصبی بودن، افسردگی، خواب آلودگی و بی‌خوابی می‌باشد.
واکنش های حساسیتی شامل تب، آنژیوادم، برونکواسپاسم و بثورات جلدی بندرت اتفاق می افتد. سمیت کبدی و مننژیت اسپتیک که به ندرت اتفاق می افتند نیز جزو واکنش های حساسیتی می باشند.
برخی از بیماران دچار اختلالات بینایی می شوند.
عوارض خونی شامل کم خونی، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، ائوزینوفیلی و آگرونولوسیتوز می باشد.
عوارض کلیوی به ویژه در بیمارانی که زمینه نارسائی کلیوی داشته اند شامل نفریت، نکروزو هیپرکالمی مشاهده شده است.

هشدارها:

۱- این دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.
۲- دوره درمان را کامل کنید.
۳- بیمار باید ابتدا هیدراته شود و بعد دارو درمانی با ناپروکسن آغاز شود.
۴- قرص را ببلعید و از شکستن و خرد کردن قرص انتریک کوتد ۵۰۰ میلی گرم خودداری نمایید.
۵- همراه با یک لیوان آب مصرف شود و تا ۱۵ دقیقه دراز نکشید.
۶- در صورت بروز نشانه های شبیه آنفولانزا (لرز- تب- درد عضلانی) و بثورات جلدی با پزشک مشورت کنید.
۷- برای بیماران کلیوی متوسط تا شدیدمصرف ناپروکسن توصیه نمی شود.
۸- قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم همراه غذا میل شود.
۹- در افرادی که ناپروکسن مصرف می کنند ممکن است نتایج غیر واقعی در آزمایشات ادواری ایجاد گردد.
۱۰- برای کاهش تحریکات گوارشی همراه غذا یا با داروهای ضد اسید مصرف کنید.

تداخلات دارویی:

این دارو با 2H بلاکرها – داروهای تجویزی در درمان بیماری های گوارشی شدید (نظیر زخم های گوارشی شدید) ، سوکرالفیت – هیدانتوئین – سولفانامیدها – سولفونیل اوره‌ها – کورتیکوستروئیدها – گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی – کورتیکوتروپین ها – مکمل های پتاسیم دار– ضد انعقادهای خوراکی (نظیر کومارین و مشتقات آن) – هپارین– مواد ترومبولیتیک– تریامترن– آسپرین و سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی– سفاماندول– سفوپرازون– سفوتتان– پلی کاماسین– والپروئیک اسید– سیکلوسپورین– لیتیم – متوترکسات – پروبنسید – ضد قارچ های آزولی تداخل دارد. در مصرف همزمان NSAIDs ها و استامینوفن احتمال عوارض کلیوی وجود دارد. باربیتورات‌ها و کورتیزون غلظت دارو را در خون کم می کند . کلسترامین جذب را پایین می آورد و در مصرف دیگوگسین باید تنظیم دوز صورت گیرد.
در صورت تجویز یا مصرف همزمان ممکن است به تنظیم دوز مصرفی این دارو با داروهای فوق نیاز باشد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۷۷۱۴۱۸۶۰- ۰۲۱

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران