

برگه راهنمای دارویی

مزالازین قرص انتریک کوتد ۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم

Mesalazine E.C.Tablet 250, 400, 500 and 800 mg

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

- راهنماییهای عمومی :

- ❖ قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه (اولسالازین، سولفاسالازین، سالیسیلات و)، غذاها، رنگها و مواد محافظ
- در صورت مصرف داروهای دیگر
- در صورت حاملگی و شیردهی

-مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می گردد.
- سلامت این دارو برای استفاده کودکان به اثبات نرسیده است.
- دارو را قبل از وعده غذایی و قبل از خواب به همراه یک لیوان پر آب مصرف نمایید.
- قرص را به طور کامل بلعید و از شکستن، له کردن یا جویدن آن امتناع کنید.
- ❖ دوز فراموش شده:
- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعد فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- ❖ مسمومیت دارویی:
- به منظور کاهش جذب می توان توسط شربت ایپکا ایجاد استفراغ کرد. در صورت نیاز بیمار را جهت شستشوی معده به مرکز پزشکی برسانید.

- مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

- مزالازین از جفت عبور می کند. به علت عدم انجام مطالعات کافی و کنترل شده از مصرف این دارو در زنان باردار، در صورت نیاز به مصرف در دوران بارداری با پزشک خود مشورت نمایید. (این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در گروه B می باشد).
- با توجه به ترشح مزالازین در شیر، در صورت نیاز به مصرف در دوران شیردهی پزشک خود را در جریان قرار دهید.

- عوارض جانبی :

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

❖ عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارضی که شیوع کمتری دارند:

سندرم عدم تحمل حاد (دردهای حاد شکمی، اسهال خونی، تب، سردرد شدید، راش های پوستی و خارش)

عوارضی که به ندرت اتفاق می افتند:

هپاتیت، پانکراتیت (درد شکم یا پشت، ضربان قلب سریع، تب، تهوع یا استفراغ و باد کردن شکم)، پریکاردیت (اضطراب، رنگ

پریدگی پوست، درد سینه، لرز، کوتاه شدن تنفس، خستگی یا ضعف غیر معمول)

❖ عوارضی که تنها در صورت تداوم و یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجهات پزشکی دارند:

عوارضی که شیوع بیشتری دارند:

دردهای شکمی، اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع با استفراغ، آب ریزش بینی، خستگی یا ضعف غیر معمول

عوارضی که میزان شیوع کمتری دارند:

آکنه، آلورسی (ریزش مو)، بی اشتهایی، درد مفاصل، سوء هاضمه و نفخ شکم

- هشدارها :

- در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر، سنجیدن منافع دارو در مقابل مضرات آن ضروری می باشد:
نارسایی عملکرد کلیه، حساسیت به مزالازین، اولسالازین، سولفاسالازین یا سالیسیلات
- به منظور بررسی روند بهبودی، به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید.
- ممکن است بیمار در طول درمان دانه های کوچک یا پوکه های قرص جذب شده را در مدفوع مشاهده کند.
- بدون هماهنگی پزشک، نام تجاری داروی مصرفی را تغییر ندهید.

-تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر (بسته به مقدار داروی مصرفی)، ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید:
لاکتولوز و امپرازول

- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- دارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- دوره درمان را کامل کنید.

تماس مشتری: 77141860 (021)

CRM@chemidarou.com