

استوماکس (آلندرونیت ۷۰): هر قرص حاوی ۷۰ میلی گرم آلندرونیت (به صورت سدیم) است. این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید: وجود هرگونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری های دیگر.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است: بزرگسالان:

- ۱- درمان پوکی استخوان در خانمها بعد از یائسگی: ۷۰ میلی گرم در روز.
- ۲- توصیه می شود جهت پیشگیری از عارضه گوارشی، دارو همراه با آب فراوان میل شود و بیمار تا نیم ساعت بعد از مصرف دارو دراز نکشد.
- ۳- حداقل ۳۰ دقیقه قبل از صبحانه با معده خالی میل شود.

منع مصرف:

حساسیت به آلندرونیت سدیم، بیماری های مری مانند آشالازی (Achalasia) و زخم مری، هیپوکلسمی، نارسایی کلیوی (سطح کراتینین کمتر از ۳۵ میلی لیتر در دقیقه).

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی اجتناب شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
رایج: اختلالات گوارشی، ورم مفصل، سرگیجه

هشدارها:

- در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر با پزشک مشورت شود:
- ۱- خونریزی گوارشی فعال، شکستگی استخوان فمور، التهاب دوازدهه، نارسایی بلع، التهاب معده، سابقه یکسال زخم معده، بیماری مری، مشکلات و یا جراحی دستگاه گوارش فوقانی.
 - ۲- قبل از آغاز درمان با این دارو کمبود ویتامین دی و هیپوکلسمی بررسی شود.
 - ۳- در طول درمان با این دارو سطح سرمی کلسیم بررسی گردد.
 - ۴- مصرف همزمان آسپیرین و آلندرونیت توصیه نمی شود.
 - ۵- در صورت بروز واکنش های مری شدید مانند ازوفاجیت یا التهاب مری و زخم مری مصرف این دارو متوقف شود.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید. آمینوگلیکوزیدها، آنتی اسیدها، نمک های کلسیم، منیزیم و آهن، دفراسیروکس، مولتی ویتامین ها شامل ویتامین های آ، د، ای و کا و مواد معدنی مثل آهن، عوامل ضد التهاب غیر استروئیدی، هورمون های پاراتیروئید، مکمل های فسفات، بازدارنده های پمپ پروتون، بازدارنده های آنژیوتنر سیستیمیک.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳



شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰