کپسول

ایتراکونازول ۱۰۰ میلی گرم

Capsule

Itraconazole 100 mg

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه (کتوکونازول، فلوکونازول، ....)، غذاها، رنگها و مواد محافظ.

۲- در صورت مصرف داروهای دیگر.

۳- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری مخصوصاً بیماریهای کلیوی، کبدی، قلبی، الکلیسم، آکلرهیدریا (فقدان اسیدکلریدریک در شیره معده).

۴- در صورت حاملگی و شیردهی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می گردد. دوز معمول دارو به صورت زیر است:

دوز معمول در بزرگسالان:

درمان آسپرژیلوزیس (قارچ) : ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک یا دو بار در روز به همراه غذا حداقل به مدت ۳ ماه مصرف شود.

درمان بلاستومایکوزیس یا هیستوپلاسموزیس: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه غذا مصرف شود. اگر روند بهبودی مشاهده نشد، میزان مصرفی به ۱۰۰ میلی گرم افزایش یابد. حداکثر میزان مصرف ۴۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

درمان کاندیدازیس: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۱۴ روز مصرف شود. میزان مصرفی برای بیماران مبتلا به AIDS و بیماران نوتروپنی تا ۲۰۰ میلی گرم به مدت ۴ هفته افزایش می یابد.

درمان کاندیدیازیس دهانه واژن: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه غذا به مدت ۳ روز.

درمان کرومو میکوزیس: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۳ تا ۶ ماه مصرف شود.

درمان کوکسیدیوایدومایکوزیس: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۶ هفته مصرف شود.

درمان کریپتوکوکوز: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.

هیستوپلاسموزیز: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.

نوتروپنی: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی ۲ بار در روز تا زمانی که میزان نوتروفیل به حداقل ۱۰۰۰/cmL برسد. درمان باید به مدت ۷ روز ادامه یابد.

درمان قارچ ناخن:

ناخن دست: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت یک هفته مصرف شود. این درمان به مدت ۳ هفته معوق مانده و سپس مجدداً به مدت یک هفته از سر گرفته می شود.

ناخن انگشت پا: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به مدت ۱۲ هفته مصرف شود.

درمان پاراکوکسیدایدومایکوزیس: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۶ ماه مصرف شود.

عفونت پنیسیلیوم : ۴۰۰ میلی گرم خوراکی، دو بار در روز به مدت ۲ ماه و سپس ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت یک ماه مصرف شود.

ایتراکونازول در درمان اولیه Penici Marneffie infection موثر می‌باشد. اگرچه بازگشت بیماری پس از درمان نیز ممکن است و درمان طولانی مدت پیش گیرنده توصیه می شود.

درمان اسپوروتریکوم: ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.

درمان کچلی: ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۱۵ روز مصرف شود.

Tine pedais: ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۳۰ روز.

دوز معمول در کودکان:

سلامت این دارو برای استفاده کودکان به اثبات نرسیده است.

دوز فراموش شده:

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوردی آن را مصرف کنید ولی چناچه زمان مصرف نوبت بعد فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.

هشدارها:

مصرف این دارو می تواند روی نتایج آزمایشات بالینی تاثیر بگذارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر (بسته به مقدار داروی مصرفی)، ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید :
الکل، داروهای هپاتوتوکسیک، آلپرازولام، دیازپام، میدازولام، تریازولام، داروهای ضد اسید، داروهای آنتی کولینرژیک، داروهای ضد اسپاسم، گیرنده های آنتاگونیست هیستامین، امپرازول، بازدارنده های پمپ پروتون، سوکرالفیت ها، داروهای ضد دیابت، آزتمیزول، ترفنادین، آتورواستاتین، سری واستاتین، لوواستاتین، سیم واستاتین، بوسولفان، دوستاکسل، آلکالوئیدهای وینکا، بوسپیرون، داروهای مسدود کننده کانال کلسیم شامل فلودیپین، نیفدیپین، وراپامیل، کاربامازپین، سیزاپراید، کلاریترومایسین، سیکلوسپورین، سیرولیموس، تاکرولیموس، القا کننده های CYP_3A_4 ، مهار کننده های CYP_3A_4 ، دیدانوزین، دیگوکسین، دیزوپیرامید، دوفتیلید، کوئینیدین، آلکالوئیدهای ارگوت شامل دی هیدروارگوتامین، ارگوترین، ارگوتامین، اریترومایسین، اینوتیاویر، ریتوناویر، ساکوئیناویر، ایزونیازید، ریفامپین، لواستیل متادون، فنوباربیتال، فنی توئین، پیموزاید، وارفارین.

شرایط نگهداری:

- دوره درمان را کامل کنید.
- دارو را در ظرف کاملاً در بسته دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.