

هر قرص روکشدار حاوی ۲/۵، ۵ و ۱۰ میلی گرم بیزوپرولول است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:

- حساسیت به بیزوپرولول و یا هر یک مواد دیگر این دارو، بیماری تنگی نفس شدید یا بیماری ریوی مزمن، مشکل گردش خون در دست و پاها (مانند سندرم رینود)، فئوکروموسیتوما، اسیدوز متابولیک (اسیدیته بالای خون)، نارسایی حاد قلب یا نارسایی قلبی که به طور ناگهانی حاد شود، فشار خون پایین، آریتمی قلبی، شوک کاردیوژنیک.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- قرص بیزوپرولول فومارات صبح‌ها با یا بدون غذا با یک لیوان آب میل نمایید و از جویدن و شکستن آن خودداری گردد.

- میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می‌شود، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

بزرگسالان:

- درد قفسه سینه و فشار خون بالا: ۵ میلی گرم در روز، حداکثر دوز ۲۰ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد.

- بیماران دارای مشکلات کلیوی و کبدی: حداکثر ۱۰ میلی گرم در روز.

- نارسایی قلبی: درمان با قرص بیزوپرولول باید از یک دوز پایین ۱/۲۵ میلی گرم آغاز و به تدریج طی چهار هفته به ۵ میلی گرم و سپس ۱۰ میلی گرم افزایش یابد. حداکثر دوز پیشنهادی ۱۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

مصرف در کودکان: قرص بیزوپرولول برای استفاده در کودکان توصیه نمی‌شود.

مصرف در افراد میانسال: در آغاز درمان پایین ترین دوز ممکن توصیه می‌شود.

به طور ناگهانی درمان را قطع نکنید.

دوز فراموش شده: در صورت فراموشی یک دوز، به محض یادآوری مصرف نمایید و در صورت نزدیک بودن دوز بعدی، از دو برابر کردن دوز مصرف خودداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری:

این دارو در دوره بارداری در گروه C قرار می‌گیرد. هیچ گونه مطالعات کنترل شده و کافی در زنان باردار وجود ندارد لذا در صورتی که منافع استفاده از دارو در بارداری بیشتر از مضرات آن باشد، با تشخیص پزشک تجویز می‌شود.

شیردهی:

از آنجایی که بسیاری از داروها در شیر مادر ترشح می‌شوند تجویز بیزوپرولول برای مادران شیرده باید با نظر پزشک انجام گیرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض شایع: کند شدن ضربان قلب یا ضربان قلب غیرعادی، تشدید علائم انسداد رگ اصلی خون در پاها به ویژه در آغاز درمان، احساس گیجی یا ضعف، مشکل در تنفس، خستگی، احساس ضعف (در بیماران قلبی مزمن)، گیجی، سر درد، احساس کرخی یا سردی در دستان یا پاها، فشار خون پایین به خصوص در بیماران با عارضه قلبی، مشکل معده یا روده نظیر حالت تهوع، استفراغ، اسهال یا یبوست.

هشدارها:

در صورت وجود موارد ذیل، به پزشک اطلاع دهید:

- ۱- دیابت، روزه داری، بیماری قلبی خاص مانند اختلال در ضربان قلب یا درد در قفسه سینه در هنگام استراحت، بیماری کبد یا کلیه، مشکل گردش خون کم شدید در دست یا پا، آسم کمتر شدید یا بیماری ریوی مزمن، سابقه پسوریازیس، فئوکروموسیتوما، اختلال تیروئید، درمان حساسیت زدایی و بیهوشی.
- ۲- در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی شدید در پوست و بافت‌های زیر پوست مانند خارش، تغییر رنگ پوست یا آنژیوادم سریعاً به پزشک مراجعه شود.

تداخلات دارویی:

آمیودارون، آملودیپین، کلونیدین، گلوکوزید دیژیتال، دیلتیازم، دیزوپیرامید، فلودیپین، فلکایینید، لیدوکائین، متیل دوپا، موکسونیدین، فنی توئین، پروپافنون، کینیدین، ریلمنیدین، وراپامیل، ایمپیرامین، آمیتریپتیلین، مکلوبماید، فنوتیازین‌ها نظیر لوومپرومازین، داروهایی که برای بیهوشی در طول یک عمل استفاده می‌شود، باریتورات‌ها نظیر فنوباربیتال، استیل سالیسیلیک اسید، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ایبوپروفن، ناپروکسن، داروهای آسم یا داروهایی که برای گرفتگی بینی استفاده می‌شود، داروهایی که برای اختلال بینایی خاص نظیر گلوکوما (آب سیاه) یا گشاد شدن مردمک چشم استفاده می‌شوند، آدرنالین، دوبوتامین، نورادرنالین، مفلوکین، ریفامپیسین، مشتقات ارگوتامین.

موارد منع مصرف:

شوگ کاردیوژنیک، نارسایی قلبی، بلوک درجه دوم یا سوم گردهلیزی بطنی (گره AV)، برادیکاردی سینوسی.

مصرف بیش از حد دارو:

مصرف بیش از حد دارو سبب برادی کاردی، افت فشار خون، بلاک قلبی، برونکو اسپاسم و شوک هیپوگلاسمی می‌شود.

احتیاط:

بسته به پاسخ هر بیمار به درمان ممکن است اختلال در رانندگی یا استفاده از ماشین آلات مشاهده شود این مسئله به خصوص در زمان شروع درمان یا تغییر دارو و یا همراه شدن با الکل در نظر گرفته شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت در داخل جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

