قرص روکش دار و کپسول

# آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

F.C.Tablet ,Capsule

# Azithromycin 500, 250 mg

قرص روکش دار آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم: هرقرص حاوی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم آزیترومایسین است.
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم: هرکپسول حاوی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم آزیترومایسین است.

**این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.**

## راهنمایی‌های عمومی:

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
– در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه نظیر اریترومایسین، غذاها ، رنگها و مواد محافظ.
– در صورت مصرف سایر داروهـــا خصوصاً آنتی اسیدها، دیگوکسین، اروگوتامین، دی هیدروارگوتامین، تریازولام، کاربامازپین، سیکلوسپورین، هگزوباربیتال و فنی توئین.
– در صورت ابتلا به هر گونه بیماری دیگر خصوصاً بیماری‌های کبدی.
۲-اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، پس از یادآوری بلافاصله آن را مصرف کنید، ولی چنانچه نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی بود از مصرف این دوز صرفنظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

## مقدار و نحوه مصرف:

۱- جهت درمان پنومونی، عفونت حلق و گلو، عفونت دستگاه تنفسی، عفونت های پوست یا عفونت بافت نرم مقدار ۵۰۰ میلی گرم بصورت یک دوز تکی در روز اول که در روزهای دوم تا پنجم با یک دوز ۲۵۰ میلی‌گرمی ادامه می یابد تجویز می شود.
۲- در درمان سینوزیت باکتریایی حاد مقدار ۵۰۰ میلی گرم ۱ بار در روز به مدت سه روز مصرف می شود.
۳- در درمان عفونت های دستگاه تناسلی یک دوز واحد یک گرمی از دارو استفاده می شود.
**توجه:** آزیترومایسین را می توان یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف کرد.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو از نظر دسته بندی FDA در گروه B قرار دارد.لذا مصرف آن در دوران بارداری باید طبق نظر پزشک و سنجیدن منافع آن در مقابل مضار آن باشد. مصرف این دارو در دوران شیردهی نیز باید حتماً با تشخیص پزشک و با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار آن باشد.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همهٔ این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.
اکثر عوارض گزارش شده از مصرف این دارو بصورت خفیف تا متوسط بوده و با قطع مصرف دارو قابل برگشت هستند. عوارض گوارشی از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، دردهای شکمی، نفخ، مدفوع خونی، سوء هاضمه، یرقان، واکنشهای حساسیتی خفیف، حساسیت به نور و در موارد نادر آنژیوادم.

## هشدارها:

۱- آزیترومایسین در کسانی که حساسیت شناخته شده با اریترومایسین و یا هر ماکرولید دیگر داشته باشند منع مصرف دارد.
۲- واکنش‌های آلرژیک بسیار نادر ولی جدی شامل آنژیوادم و آنافیلاکسی در اثر مصرف این دارو در بعضی از افراد دیده شده است.
۳- این دارو نباید در افرادی که مشکل و یا نارسایی کبدی دارند مصرف شود.

## تداخلات دارویی و اثر بر پاسخ تست های آزمایشگاهی:

در صورت مصرف همزمان آزیترومایسین با داروهای زیر ممکن است تداخلاتی بروز نماید لذا قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید :
داروهای ضد اسید حاوی آلومینیوم و منیزیم، سیکلوسپورین، دیگوکسین، هگزوباربیتال، فنی توئین، ترفنادین، دی هیدروارگوتامین، ارگوتامین، نلفیناویر و وارفارین.

**تـاثیر بر پـــاسخ تست های آزمایشگاهی:** آزیتروما‌یسین می تـــواند موجب افزایش پاسخ تست هـــای آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز،کراتین کیناز، گاما گلوتامیل ترانسفراز، لاکتات دهیدورژناز، بیلی روبین و پتاسیم سرم شود.

## شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شـــرکت صنعتـــی کیمیـدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری:۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران