

قرص باکلوفن ۱۰ میلی گرم: هر قرص حاوی ۱۰ میلی گرم باکلوفن است.

قرص باکلوفن ۲۵ میلی گرم: هر قرص حاوی ۲۵ میلی گرم باکلوفن است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری و شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

بزرگسالان:

۱- درد ناشی از اسپاسم عضلانی: ۵ تا ۱۰ میلی گرم ۳ بار در روز.

۲- سکسکه ناشی از اتساع معده: ۵ میلی گرم دو بار در روز.

۳- حالت انقباضی شدید مزمن ناشی از اختلالاتی مانند مولتیپل اسکلروزیس یا آسیب نخاعی: در ابتدا ۵ میلی گرم ۳ بار در روز، به تدریج افزایش می‌یابد، مقدار نگهدارنده تا ۶۰ میلی گرم در روز در ۳ دوز منقسم (چنانچه بعد از ۶ هفته درمان با حداکثر دوز بهبودی حاصل نشد در خصوص ادامه درمان بررسی شود)، حداکثر ۱۰۰ میلی گرم در روز.

۴- کارایی و بی‌خطری این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال یا با وزن کمتر از ۳۳ کیلوگرم اثبات نشده است.

منع مصرف:

حساسیت به باکلوفن، زخم گوارشی فعال، علائم واکنش آلرژیک شامل راش، خارش و ورم صورت، لب، گلو یا زبان.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
خواب‌آلودگی، سستی، احساس ضعف، خشکی دهان، سردرد، گیجی یا سرگیجه خفیف، خستگی، مشکلات و درد عضلانی، افسردگی، اختلالات خلقی، توهم، کابوس، فشار خون پایین، مشکلات معده شامل تهوع، استفراغ، اسهال یا یبوست، بی‌خوابی، راش پوستی، تعریق بیش از حد، مشکلات چشمی، مشکلات ادراری، مشکلات تنفسی، عدم تعادل، لرزش و عدم کنترل عضلانی.

هشدارها:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک مشورت شود:

اختلال ذهنی، بیماری کبد، کلیه یا ریه، نارسایی تنفسی یا ریه، دیابت، سکت، بیماری صرع، مشکلات ادراری، بیماری پارکینسون، فشار خون بالا، بارداری یا شیردهی، سابقه اعتیاد و الکلیسم، سالمندان، بیماری مغزی-عروقی، سابقه زخم گوارشی، مشکلات مثانه، مشکلات روانی.

۱- از آنجا که مصرف این دارو ایجاد خواب‌آلودگی یا گیجی می‌کند، پس از مصرف دارو از رانندگی و سایر فعالیت‌هایی که به تمرکز و هوشیاری کامل نیاز دارند، خودداری کنید.

- ۲- قبل از هرگونه عمل جراحی به پزشک خود در مورد مصرف این دارو اطلاع دهید.
- ۳- از قطع ناگهانی دارو خودداری شود، قطع دارو می‌بایست با نظر پزشک و به صورت تدریجی انجام پذیرد.
- ۴- مصرف باکلوفن ممکن است خطر ابتلا به کیست تخمدان را افزایش دهد.
- ۵- از مصرف دارو بیشتر از مقدار توصیه شده توسط پزشک، خودداری شود.
- ۶- تمایل به خودکشی

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید.

- تیزانیدین، لیتیم، آمیتریپتیلین، دیلتیازم، ایبوپروفن، لوودوپا یا کربی دوپا، پرومتازین، مورفین، کاربامازپین، منیزیم سولفات، مینوسیکلین، میرتازاپین، اکسی کدون، پرامپانل، پرامی پکسول، زولپیدم، فنتانیل، اتیل الکل، آزلاستین، بوپرنورفین، هیدروکسی‌زین، روپینیرول.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت داخل و جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵

