

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- حساسیت به دارو، غذاها و رنگ ها و ...
- شیردهی
- مصرف در سالمندان
- مصرف سایر داروها مانند داروهای ضد دیابت خوراکی از مشتقات سولفونیل اوره، انسولین، مهارکننده های کانال کلسیم، به ویژه دیلتیازم و وراپامیل.
- وجود بیماری ها بویژه مشکلات قلبی، سابقه شوک آنافیلاکتیک به مواد حساسیت زا، برادی کاردی شدید، هیپوتانسیون، بلوک درجه ۲ یا ۳ VA، آسم برونشial یا اسپاسم برونش، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسایی احتقانی قلب، دیابت یا هیپوگلیسمی، هیپرتیروئیدسم، نشانگان سینوس غیر طبیعی بدون پیس میکر، شوک کاردیوژنیک، اختلال مشهود عملکرد کبد از نظر بالینی، اختلال عمل کلیه، بیماری های عروق محیطی.
- ۱- دارو را هر روز در زمان مشخص میل کنید.
- ۲- دارو را همراه با غذا میل کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود. از نظر دسته بندی FDA در دوران بارداری در گروه C قرار دارد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

بزرگسالان:

- نارسایی احتقانی قلب: شروع با ۳/۱۲۵ میلی گرم دو بار در روز به همراه غذا به مدت دو هفته، قابل افزایش هر دو هفته یکبار بر اساس تحمل بیمار ۲۵ میلی گرم ۲ بار در روز برای بیماران با وزن کمتر از ۵۸ کیلوگرم وزن و ۵۰ میلی گرم دو بار در روز برای بیماران با وزن بیش از ۵۸ کیلوگرم محدوده مصرف در این بیماران است.

توجه:

- ۱- در هر مرحله افزایش دوز، بیمار باید به مدت یک ساعت از نظر نشانه های سر گیجه تحت مراقبت قرار گیرد.
- ۲- در صورت مصرف همزمان دیورتیکال، دیورتیک ها و یا مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین دوز این دارو یا هریک از داروهای یاد شده باید تنظیم گردد.

فشار خون:

- ۱- دوز اولیه: ۶/۲۵ میلی گرم دو بار در روز به همراه غذا. در صورت نیاز و تحمل بیمار قابل افزایش به ۱۲/۵ میلی گرم پس از ۷-۱۴ روز، حد اکثر تا ۲۵ میلی گرم. اثر کاهش فشار خون به صورت کامل پس از ۷-۱۴ روز دیده می شوند.
- ۲- دوز نگهدارنده: ۵۲-۶/۲۵ میلی گرم دو بار در روز.
- کودکان: امنیت و اثر بخشی این دارو در کودکان جوان تر از ۱۸ سال مشخص نشده است.

منع مصرف:

حساسیت به استامینوفن، مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، نارسایی کبدی شدید یا بیماری کبد اکتیو شدید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

کاربرد این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب منجر به بدتر شدن عملکرد کلیه می شود که با قطع مصرف آن بر طرف می گردد. عوارض نادر دیگر ناشی از مصرف این دارو بلوک شریانی- بطنی (VA) و کم خونی ماهیچه قلب می باشد.

هشدارها:

- ۱- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، پس از یادآوری بلافاصله آن را مصرف کنید، ولی چنانچه نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی بود از مصرف این دوز صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- ۲- در خلال مصرف این دارو دائماً تحت نظر پزشک باشید.
- ۳- در مصرف دارو وقفه ایجاد نکرده و سر خود مصرف آنرا قطع نکنید.
- ۴- در صورت نیاز به هر نوع جراحی شامل جراحی دندان یا معالجه اورژانس احتیاط لازم است.
- ۵- در افراد دیابتی، دارو ممکن است نشانه‌ها و علائم هیپوگلیسمی را پوشانده یا باعث افزایش غلظت قند خون شده و یا افت قند خون را طولانی نماید.
- ۶- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- ۷- از مصرف سایر داروها به ویژه داروهای بدون نسخه مقلد سمپاتیک بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- ۸- در خلال مصرف این دارو هرگز به یکباره از حالت خوابیده یا نشسته به حالت سر پا تغییر وضعیت ندهید.
- ۹- در صورت بروز سرگیجه یا غش پزشک خود را آگاه نمایید.
- ۱۰- در مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب، در صورت افزایش وزن یا کوتاه شدن تنفس به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۱۱- در صورت کاربرد لنزهای تماسی چنانچه از میزان ترشح اشک کاسته شد به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۱۲- در افراد مسن عارضه سرگیجه ممکن است نسبت به افراد جوان‌تر بارزتر باشد.
- ۱۳- مصرف این دارو پیش از جراحی به همراه داروهای بیهوشی عمومی همچون سیکلوپروپان، اتر و تری کلرواتیلن ممکن است سبب تضعیف بیشتر عملکرد ماهیچه قلب گردد.

عوارض دیگر ناشی از مصرف این دارو عبارتند از:

عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند:

- ۱- با شیوع بیشتر: حساسیت، برادیکاردی، درد قفسه سینه، سرگیجه، کوتاه شدن تنفس، ادم عمومی، ادم محیطی، فشار خون، درد، سنکوپ، افزایش وزن.
- ۲- با شیوع کمتر: تب، خون در ادرار، آسیب کبدی (با علائمی شبیه زرد یرقان)، افسردگی روحی، ترومبوسیتوپنی.
- ۳- عوارضی که در صورت تداوم یا بدتر شدن نیاز به توجه پزشک دارند.
- ۴- با شیوع بیشتر: درد پشت، اسهال، احساس ضعف و خستگی غیر عادی، احساس سوزش یا گزگز.
- ۵- با شیوع کمتر: درد شکم، درد مفاصل، تاری دید، سر درد، مشکل خواب، کاهش در ترشح اشک چشم، درد ماهیچه‌ها، گلودرد، آبریزش بینی، افزایش تعریق، استفراغ.

تداخل با داروها و آزمایشات تشخیصی طبی:

این دارو با داروهای بیهوشی عمومی مانند سیکلوپروپان، اتر و تری کلرواتیلن؛ ترکیبات ضد دیابت سولفونیل اوره، انسولین، مهار کننده‌های کانال کلسیم بویژه دیلتیازم و وراپامیل، ترکیبات کاهش دهنده کاتکول آمین‌ها مانند مهار کننده‌های آنزیم مونوآمین اکسیداز، زربین، کلونیدین، دیگوکسین، ترکیبات القاء کننده یا بازدارنده سیستم آنزیم‌های سیتوکروم P4۰۵ کبدی مانند ریفاپمپین، سایمتیدین، فلوکستین، پاروکستین، پروپافنون و کینیدین تداخل دارد. در صورت تجویز همزمان این دارو با هر یک از داروهای یاد شده ممکن است به حذف یا تنظیم دوز هر یک نیاز باشد.

این دارو با تست‌های تعیین مقدار بیلی روبین خون، آنزیم‌های ترانس آمیناز و گلوکز تداخل دارد.

- مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و یا مشاهده عوارض به شکل شدید و یا حالت کما، درمان متوقف و هر چه سریعتر مسموم را به بیمارستان برسانید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



شرکت صنعتی کیمی‌دارو

www.chemidarou.com

CRM@chemidarou.com

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰