

suspension

Zitrochem 200 (Powder for 15 mL, 22.5 mL, 30 mL Azithromycin Oral suspension)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

- ۱- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می‌باشد.
 - ۲- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.
 - ۳- لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هریک از شرایط زیر می باشد پزشک خویش را مطلع سازد:
- سابقه حساسیت نسبت به آزیترومایسین، اریترومایسین و سایر آنتی بیوتیک‌های ماکرولیدی، سابقه اختلالات عملکرد کبدی، در صورت استفاده از داروهای دیگر به ویژه داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیم

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف در بارداری:

داده‌های موجود از مطالب منتشر شده و تجربه‌های بازاریابی در طول چند دهه در خصوص مصرف آزیترومایسین در زنان باردار، هیچ خطری در ارتباط با دارو برای نقص‌های عمده‌ی مادرزادی یا پیامدهای مادر و جنین را نشان نمی‌دهد.

مصرف در شیردهی:

از آنجاییکه مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد لذا استفاده از آن در دوران شیردهی باید با صلاحدید پزشک معالج انجام شود.

موارد احتیاط:

- ۱- تجویز این دارو در افراد دارای سابقه اختلالات عملکرد کبدی باید با احتیاط صورت گیرد.
- ۲- بیمار باید بلافاصله پس از بروز علائم کولیت پسودوممبران (نظیر سوزش و دردهای شکمی شدید، اسهال شدید و آبکی گاهی همراه با خون و تب) و علائم واکنش‌های حساسیتی (نظیر اشکال در تنفس، تورم در صورت، دهان، گردن، دست و پاها) مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک خویش اطلاع دهد.
- ۳- مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمایشات آنزیم‌های کبدی (ALT, AST) و همچنین کراتینین کیناز، گاما، گلوتامین ترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز، پتاسیم و بیلی روبین سرمی می‌گردد.
- ۴- به استثناء موارد خاص که پزشکتان لازم می داند، این دارو در موارد زیر منع استعمال دارد:
- ۵- این دارو نباید به همراه داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیم مصرف گردد.

تداخلات دارویی:

از آنجاییکه مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخلات دارویی می باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید پزشک خود را مطلع سازید:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم (باعث کاهش غلظت Cmax آزیترومایسین می‌شوند)، کاربامازپین، سیکلوسپورین، دیگوکسین، فنی توتین، تتوفیلین و ترفنادین) و دی هیدرو ارگوتامین، ارگوتامین و وارفارین.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

دوز معمول در کودکان بالای ۶ ماه:

درمان التهاب حاد گوش میانی (ناشی از هموفیلوس آنفلونزا، موراکسلا کاتارالیس یا استرپتوکوک پنومونی):
 ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت تک دوز و یا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت سه روز و یا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت تک دوز در روز اول مصرف شود سپس به صورت ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یک بار در روز از روز دوم تا پنجم ادامه یابد.

سینوزیت باکتریایی حاد: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یک بار در روز به مدت سه روز. پنومونی اکتسابی ناشی از کلامیدوفیلای پنومونی، هموفیلوس آنفلونزا، مایکوپلاسما پنومونی یا استرپتوکوک پنومونی:

۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت تک دوز در روز اول مصرف شود سپس به صورت ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یکبار در روز از روز دوم تا پنجم ادامه یابد.
دوز معمول در کودکان بالای ۲ سال:

فارنژیت/ التهاب لوزه: ناشی از استرپتوکوک پیوژنز به عنوان جایگزینی برای خط اول درمان

۱۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یکبار در روز به مدت ۵ روز.

سلامتی و اثر بخشی این دارو برای درمان التهاب حاد گوش میانی، سینوزیت باکتریایی حاد و پنومونی اکتسابی از جامعه در افراد زیر ۶ ماه و در درمان فارنژیت/ التهاب لوزه در افراد زیر ۲ سال اثبات نشده است.
در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را بیشتر از مقدار تجویز مصرف نکنید.
- دارو را تا پایان دوره درمان بطور کامل مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هریک از آن ها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

واکنش های حساسیتی (حساسیت شدید به آزیترومايسين، اريترومايسين یا سایر ماکرولیدها)، کولیت پسودوممبران و به ندرت واکنش های حساسیتی شدید نظیر آنافیلاکسی و آنژیوادم و نقص عملکرد کبدی.

۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شایع:

ناراحتی گوارشی (دردهای شکمی، اسهال خفیف، تهوع و استفراغ)

نادر:

اختلال در تعادل و سردرد

مسمومیت دارویی:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل نمایید و یا خود را به واحد درمانی برسانید.

طریقه آماده نمودن سوسپانسیون آزیترومايسين و نحوه صحیح برداشت مقدار مشخص از دارو و مصرف آن:
بطری حاوی پودر را قبل از اضافه کردن آب تکان داده تا ذرات پودر از هم جدا شوند، سپس **آب جوشیده سرد شده** را در دو مرحله تا خط نشانه به پودر اضافه نموده و هر بار بطری را خوب تکان دهید.

دقت شود قبل از هر بار مصرف دارو، بطری حاوی سوسپانسیون آماده شده به خوبی تکان داده شود.

شرایط نگهداری:

- سوسپانسیون آماده شده را دور از نور و درون جعبه به مدت ۳ روز در دمای اتاق و ۵ روز در یخچال نگهداری کنید و باقیمانده سوسپانسیون را دور بریزید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

