کپسول

لانسوپرازول (انتریک کوتد) ۱۵ و۳۰ میلی گرم

Capsule

Lansoprazole (E.C.) 30 , 15 mg

هر کپسول حاوی ۱۵ و ۳۰ میلی‌گرم لانسوپرازول (انتریک کوتد) است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:

۱- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به لانسوپرازول، غذاها، رنگ ها و یا مواد محافظ.

۲- در صورت مصرف داروهای دیگر خصوصاً سوکرالفیت و وارفارین.

۳- در صورت حاملگی و شیردهی.

۴- در صورت وجود بیماری های ذیل ارزیابی منافع دارو در مقابل مضرات آن ضروری می باشد.

۵- نارسایی عملکرد کبد - بیماری فنیل کتونوری.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می گردد. دوز معمول دارو به صورت زیر است:

۱- دارو را دقیقاً طبق دستور و در زمان مناسب مصرف نمایید.

۲- کپسول را بلعیده و از شکستن یا جویدن آن امتناع کنید.

۳- دارو قبل از وعده غذایی (به ویژه صبحانه) میل شود.

دوز معمول در بزرگسالان:

-جهت درمان برگشت غذا از معده به مری یا اصطلاحا ترش کردن:

به منظور تسکین سوزش معده و استفراغ، مقدار ۱۵ میلی گرم یک نوبت در روز مصرف شود. برای درمان التهاب مری همراه آسیب مخاطی، مقدار ۳۰ میلی گرم در روز به مدت ۸ هفته توصیه می شود. یک دوره هشت هفته ای مازاد برای بیمارانی که در زمان قید شده بهبود نیابند مفید خواهد بود. به منظور پیشگیری از عود بیماری، سومین دوره هشت هفته ای توصیه می گردد. در بیمارانی که نیاز به درمان طولانی دارند، مقدار ۱۵ میلی گرم یک نوبت در روز توصیه می شود.

- جهت درمان زخم معده:

مقدار ۳۰-۱۵ میلی گرم در روز در یک نوبت (ترجیحاً قبل از صبحانه) حداکثر به مدت ۸ هفته مصرف شود.

- جهت درمان زخم دوازدهه:

مقدار ۳۰-۱۵ میلی گرم در روز در یک نوبت (ترجیحـــاً قبل از صبحانه) حداکثر به مدت ۴ هفته مصرف شود. در بیمارانی که نیاز به درمان طولانی دارند، مقدار ۱۵ میلی گرم یک نوبت در روز توصیه می شود.

- جهت درمان زخم دوازدهه همراه با عفونت هلیکوباکتر پیلوری:

رژیم درمانی سه گانه: شامل ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول به علاوه ۱ گرم آموکسی سیلین به اضافه ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین. هرسه دارو قبل از وعده غذایی و ۲ بار در روز مصرف شود. طول دوره درمان ۱۰ تا ۱۴ روز است.

رژیم درمانی دوگانه: شامل ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول به اضافه ۱ گرم آموکسی سیلین. هر دو دارو بایستی ۲بار در روز و قبل از وعده غذایی مصرف گردند. طول دوره درمان ۱۴روز است.

نکته:

جهت درمان سندرم ترشح بیش از حد اسید معده (زولینگر-الیسون):

مقدار ۶۰ میلی گرم در روز در یک نوبت (ترجیحاً قبل از صبحانه) میل شود. میزان دوز در صورت نیاز افزایش می یابد. درمان تا زمان بهبود نشانه های کلینیکی ادامه می یابد. در برخی بیماران مقدار دوز تا ۹۰ میلی گرم در روز، در دو نوبت و به مدت ۴ سال نیز مصرف گردیده است. دوزهای بیش از ۱۲۰ میلی گرم در روز باید در نوبت های مجزا مصرف گردد.

نکته: میزان دوز مصرفی در بیمـــاران با نارسایی شدید کبدی باید کاهش یابد. بطور کلی در این بیمـــاران میزان مصرف نباید بیش از ۳۰ میلی گرم در روز باشد.
محدودیت های تجویز در بزرگسالان.
زخم دوازدهه و زخم معده: ۳۰ میلی گرم در روز.
در شرایط افزایش ترشحات دستگاه گوارش: ۱۸۰ میلی گرم در روز.

دوز فراموش شده:
به محض یادآوری کپسول را مصرف کنید. در صورت نزدیکی به زمان مصرف بعدی از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

-از آنجایی که مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در زنان باردار صورت نگرفته است، لذا مصرف آن در دوران بارداری باید تحت نظر پزشک باشد. (طبق نظرFDA این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در رده B می باشد).
- مدرکی دال بر ترشح لانسوپرازول در شیر مادر در انسان وجود ندارد. ایمنی مصرف دارو در دوران شیردهی مشخص نشده است.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
عوارضی که نیاز به توجهات پزشکی دارند:
۱- عوارض شایع: اسهال و بثورات جلدی یا خارش.
۲- عوارضی که کمتر اتفـــاق می افتد: دردهای شکمی، درد مفاصل، افزایش یا کـــاهش اشتها، تهوع و استفراغ.
۳- عوارضی که به ندرت اتفاق می افتد: اضطراب، یبوست، علائم شبیه آنفلوآنزا، سرفه زیاد، افسردگی، درد عضله، کاهش تعداد پلاکت (خون ریزی یا کبودی غیر معمول)، التهاب روده بزرگ همراه با زخم (اسهال، دردهای شکمی و خونـــریزی مقعدی) و نشـــانه هـــای التهاب عفونت دستگـــاه تنفسی (نشـــانه های سرمـــاخوردگی).

هشدارها:

کارآیی این دارو در کودکان زیر یکسال به اثبات نرسیده است.
در طول درمان با این دارو، جهت بررسی روند بهبودی به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.
کپسول ها را بدون شکستن و جویدن میل نمایید افرادی که نمی توانند کپسول را بصورت کامل ببلعند می توانند گرانول های داخل کپسول را درون قاشق ریخته و میل نمایند ولی گرانول ها نیز باید بدون له نمودن و بصورت کامل و فورا بلعیده شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید :
۱- سوکرالفیت و وارفارین
۲-لنسوپرازول روی جذب داروهای استری، آمپی سیلین ها، دیگوکسین، نمک های آهن وکتوکونازول تاثیر می گذارد.

شرایط نگهداری:

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شـــرکت صنعتـــی کیمیـــدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری:۷۷۱۴۱۸۶۰- ۰۲۱

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران