قرص خط دار خوراکی

آلوپورینول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم

Oral Scored Tablet

Allopurinol 300 &100 mg

هر قرص حاوی ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم آلوپورینول است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:

وجود هر گونه حساسیت، درصورت بارداری یا اقدام به بارداری و همچنین شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

بزرگسالان:

نقرس خفیف: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز.

نقرس توفوسی متوسط تا شدید: ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم در روز.

کاهش حملات نقرسی: دوز اولیه ۱۰۰ میلی‌گرم در روز، به این مقدار در فواصل یک هفته‌ای ۱۰۰ میلی‌گرم افزوده شود تا غلظت اسید اوریک سرم به ۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر.

کنترل اوریک اسید در سرم خون در بیماران مبتلا به سرطان خون، لنفوم و تومور بدخیم تحت درمان سرطان: ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌گرم در روز.

عود سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز در دوزهای منقسم یا تک دوز.

حداکثر مقدار مجاز آلوپورینول در بزرگسالان روزانه ۸۰۰ میلی‌گرم می باشد. مقادیر بیشتر از ۳۰۰ میلی‌گرم باید به صورت منقسم تجویز شود.

از قطع دارو بدون دستور پزشک خودداری شود.

دارو بعد از غذا و با مایعات فراوان میل شود.

آلوپورینول برای درمان هایپراوریسمی بدون علامت توصیه نمی‌شود.

کودکان:

هایپر اوریسمی ثانویه با تومور بدخیم:

کمتر از ۶ سال: ۵۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز.

۶ تا ۱۰ سال: ۳۰۰ میلی‌گرم به صورت تک دوز یا منقسم.

منع مصرف:

سابقه حساسیت به آلوپورینول یا هر یک از اجزای سازنده دارو.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا احتمال بارداری به پزشک خود اطلاع دهید. مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض جانبی شایع: افزایش موقت حملات حاد نقرسی، درماتیت و آلرژی به صورت راش های پوستی، راش ماکولوپاپولار، کهیر و خارش، اسهال، تهوع، استفراغ و دردهای شکمی، افزایش آلکالین فسفاتاز، افزایش AST/ALT.

عوارض جانبی قابل توجه بالینی:
۱- در صورت ایجاد اولین راش‌های پوستی یا سایر علائم واکنش حساسیت مفرط، دارو را قطع کنید و به پزشک معالج اطلاع دهید.
۲- بدلیل احتمال سمیت کلیوی، سمیت کبدی و سرکوب مغز استخوان وضعیت بیماران هنگام مصرف این دارو باید بدقت پایش شود.

هشدار:

۱-مقدار مصرف آلوپورینول در بیماران با اختلال عملکرد کلیوی و کبدی و کاهش فعالیت مغز استخوان باید تنظیم شود.
۲- در صورت افزایش موقت حملات حاد نقرسی، درمان‌های همزمان با توجه به نظر پزشک معالج صورت پذیرد.
۳- این دارو ممکن است موجب گیجی و خواب آلودگی شود لذا تا زمان مشخص شدن اثرات دارو از رانندگی، کار با ماشین‌آلات و سایر فعالیت‌های پرخطری که نیاز به توجه و تمرکز دارند خودداری کنید.
۴- در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی و فشار خون بالا با پزشک مشورت شود.
۵- مصرف مقدار زیاد ویتامین ث، خطر ایجاد سنگ کلیه را افزایش می‌دهد پیش از مصرف ویتامین ث با پزشک مشورت شود.
۶- خطر ابتلا به حساسیت پوستی در بیماران کلیوی در صورت استفاده از این فرآورده افزایش می‌یابد.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید.
آزاتیوپرین، کلرپروپامید، سیکلوسپورین، سیکلوفسفامید، مرکاپتوپورین، کپسیتابین، فلوروواوراسیل، وارفارین، تئوفیلین، داروهای ادرارآور، آسپیرین، ویدارابین، آمپی‌سیلین، آموکسی‌سیلین، دیدانوزین، داروهای دیابتی، داروهای دیگر درمان نقرس، بازدارنده‌های ECA، پیرازینامید، آلومینیوم هیدروکسید.

شرایط نگهداری:

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۷۷۱۴۱۸۶۰- ۰۲۱

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران