قرص خط دار

ملوکاکس® (ملوکسیکام) ۱۵ و ۷/۵ میلی گرم

Scored Tablet

Melocox ®(Meloxicam) 15, 7.5 mg

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هر یک از شرایط زیر می‌باشد، پزشک خویش را مطلع سازد:

۱- سابقه حساسیت به آسپیرین و یا دیگر NSAIDs.

۲- بیماری‌های خونریزی دهنده گوارشی و یا سابقه آن، زخم معده، بیماری های قلبی- عروقی و یا سابقه آن.

۳- سابقه آسم و انقباض مجاری‌هوایی ناشی از وجود پولیپ بینی به واسطه مصرف آسپیرین.

۴- مصرف الکل و یا سیگار.

۵- نارسایی کبدی و کلیوی.

۶- مصرف داروهای دیگر بخصوص آسپیرین و لیتیم.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه‌ای که پزشک تان دستور داده استفاده فرمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

دوز بزرگسالان: در آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت ۷/۵ میلی گرم یکبار در روز بوده که در صورت لزوم و دستور پزشک تا ۱۵ میلی گرم در روز قابل افزایش است و حداکثر در دوز ۱۵ میلی گرم در روز می باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال در آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت هنوز به اثبات نرسیده است، اما در بیماران آرتریت روماتوئید Juvenile با دوز ۰/۱۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن یک بار در روز مصرف می شود و حداکثر دوز ۷/۵ میلی گرم یکبار در روز می باشد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه فرمایید:

۱- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز نفرمایید.

۲- این دارو را همراه یا بعد از غذا مصرف نمایید.

۳- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

۱- مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است لذا مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن توسط پزشک سنجیده شده باشد.

۲- مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی‌باشد. مطالعات روی حیوان نشان دهنده وجود ملوکاکس در شیر مادر با غلظتی بالاتر از پلاسما می باشد. به دلیل ریسک ایجاد عوارض جانبی شدید روی نوزاد مصرف دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت استفاده از آن شیردهی باید قطع شود. .

عوارض جانبی:

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شیوع کم:

واکنش‌های حساسیتی (اشکال در بلع، پف‌آلودگی و ورم پلک‌ها، اطراف چشم، صورت، لب‌ها و زبان، کوتاه شدن تنفس، تنگی نفس و خس‌خس سینه) و خونریزی دستگاه گوارش (مدفوع سیاه و قیرمانند، وجود خون شبیه تفاله‌های قهوه در استفراغ، درد شدید معده)، آلبومینوری، آنژین پکتوریس، آنژیوادم آریتمی، آسم، بیلی رو بینی، برونکواسپاسم، وزیکولهای پوستی، نارسایی قلبی، کولیت، تشنج، تنگی نفس، ادم صورت، وجود خون در ادرار، علائم هپاتیت، افزایش یا کاهش قند خون، لکوپنی، ضربان قلب نا منظم، علائم پانکرانیت، واکنشهای حساسیتی به نور، زردی و خارش پوست، زخم های دهانی، تاکی کاردی، ترومبوسیتوپنی، ترمور و واسکولیت لنکوپ.

۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: اسهال، سوء هاضمه و نفخ.

نادر: درد شکم، اضطراب، گیجی، یبوست، تهوع و استفراغ، حالت عصبی و خواب‌آلودگی، دیدن خواب و رویای غیر معمول، تغییرات در بینایی، ریزش و نازک شدن موها، افزایش اشتها، اغتشاش غدد، قرمزی و درد و تورم چشم، پلک و سوزش، خارش و افزایش اشک چشم، یبوست، دهیدراسیون، احساس افسردگی، خشکی دهان، احساس نفخ، سوء هاضمه، خستگی، تب، گاستریت، احساس سوزش سر دل، گرگرفتگی، احساس ضعف و خستگی، تهوع، پارستزی، افزایش تعریق، تغییرات در احساس طعم و مزه، وزوز گوش و کاهش یا افزایش وزن.

موارد احتیاط:

۱- مصرف طولانی این دارو بایدتحت نظارت پزشک انجام پذیرد.

۲- از مصرف همزمان چند داروی NSAIDs از جمله کتورولاک با ملوکاکس خودداری کنید. مصرف همزمان استامینوفن، آسپیرین و یا سایر سالیسیلاتها حتماً تحت نظر پزشک صورت پذیرد.

۳- در صورت بروز علائم ادم، خونریزی یا زخم دستگاه گوارش، بیماریهای قلبی- عروقی، اضافه وزن غیر طبیعی یا راش پوستی پزشک باید سریعاً در جریان قرار گیرد.

۴- در صورت وقوع نشانه های مسمومیت کبدی شامل تب، خستگی، خارش پوست، لتارژی، تهوع و یا درد شکم بیمار می بایست سریعاً پزشک خود را مطلع سازد.

۵- مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمون های عملکرد کبدی (AST , ALT) می گردد.

۶- به استثناء موارد خاص که پزشک تان لازم می‌داند، این دارو در موارد زیر منع استعمال دارد:

- حساسیت به ملوکاکس و یا هریک از اجزا متشکله.
- سابقه آسم، انقباض مجاری هوایی (ناشی از پولیپ بینی بواسطه مصرف آسپیرین)، کهیر، آنژیوادم پس از مصرف داروها به ویژه آسپرین و سایر NSAIDs.
- به عنوان ضددرد در بیمارانی که کاندید CABG (Coronary Artery Bypass Graft) می‌باشند.

تداخلات دارویی:

از آنجایی که مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می‌باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

مصرف همزمان این دارو با مهارکننده‌های ACE (افزایش خطر سمیت کلیوی و کاهش اثر ضد فشار خونی)، آسپیرین (افزایش عوارض گوارشی)، فوروزماید (بررسی عملکرد کلیه در طی مصرف همزمان)، لیتیم (افزایش سطح سرمی لیتیم) و وارفارین (افزایش اثر ضدانعقادی وارفارین) و متوتروکسات (افزایش سمیت کبدی متوتروکسات) دارای تداخل دارویی می‌باشد.

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه :

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل فرمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط نگهداری:

- دارو در دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران