

برگه راهنمای دارویی

Itraconazole Capsules 100 mg

ایتراکونازول کپسول ۱۰۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

- راهنمایی های عمومی :

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه (کتوکونازول، فلوکونازول، ...)، غذاها، رنگها و مواد محافظ
- در صورت مصرف داروهای دیگر
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری مخصوصاً بیماریهای کلیوی، کبدی، قلبی، الکلیسم، آکلریدریا (فقدان اسیدکلریدریک در شیره معده)
- در صورت حاملگی و شیردهی

- مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می گردد. دوز معمول دارو به صورت زیر است:
دوز معمول در بزرگسالان:

درمان آسپرژیلوزیس (قارچ): ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک یا دو بار در روز به همراه غذا حداقل به مدت ۳ ماه مصرف شود.
درمان بلاستومایکوزیس یا هیستوپلاسموزیس: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه غذا مصرف شود. اگر روند بهبودی مشاهده نشد، میزان مصرفی به ۱۰۰ میلی گرم افزایش یابد. حداکثر میزان مصرف ۴۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

درمان کاندیدازیس: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۱۴ روز مصرف شود.
میزان مصرفی برای بیماران مبتلا به AIDS و بیماران نوتروپنی تا ۲۰۰ میلی گرم به مدت ۴ هفته افزایش می یابد.
درمان کاندیدیدایزیس دهانه واژن: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه غذا به مدت ۳ روز.
درمان کرومو میکوزیس: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۳ تا ۶ ماه مصرف شود.

درمان کوکسیدیوایدومایکوزیس: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۶ هفته مصرف شود.
درمان کریپتوکوکوز: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.
هیستوپلاسموزیس: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.
نوتروپنی: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی ۲ بار در روز تا زمانی که میزان نوتروفیل به حداقل ۱۰۰۰/mcl برسد. درمان باید به مدت ۷ روز ادامه یابد.

درمان قارچ ناخن:

ناخن دست: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، ۲ بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت یک هفته مصرف شود. این درمان به مدت ۳ هفته معوق مانده و سپس مجدداً به مدت یک هفته از سر گرفته می شود.
ناخن انگشت پا: ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به مدت ۱۲ هفته مصرف شود.
درمان پاراکوکسیدیوایدومایکوزیس: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۶ ماه مصرف شود.

عفونت پنسیلیوم : ۴۰۰ میلی گرم خوراکی، دو بار در روز به مدت ۲ ماه و سپس ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت یک ماه مصرف شود.

ایتراکونازول در درمان اولیه *Penicilium Marneffeii* infection موثر می باشد. اگرچه بازگشت بیماری پس از درمان نیز ممکن است و درمان طولانی مدت پیش گیرنده توصیه می شود.

درمان اسپوروتریکوم: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی مصرف شود.

درمان کچلی: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۱۵ روز مصرف شود.

Tinea pedis: ۱۰۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به همراه وعده غذایی به مدت ۳۰ روز.

- دوز معمول در کودکان:

سلامت این دارو برای استفاده کودکان به اثبات نرسیده است.

- دوز فراموش شده:

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعد فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

- از آنجائیکه مطالعات کافی و کنترل شده ای از مصرف این دارو در زنان باردار صورت نگرفته است، لذا مصرف آن در دوران بارداری باید طبق نظر پزشک و سنجیدن منافع آن در مقابل مضرات آن باشد. (این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در گروه C می باشد).

- با توجه به ترشح ایتراکونازول در شیر، در صورت نیاز به مصرف حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

- عوارض جانبی :

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمامی عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

❖ عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

تب و لرز، بثورات جلدی، خارش، گلودرد، عوارض پوستی

❖ عوارضی که تنها در صورت تداوم و یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجهات پزشکی دارند:

- عوارضی که کمتر رخ می دهند:

ناراحتی های معده و روده (درد شکمی، یبوست، کاهش اشتها، استفراغ)

- عوارضی که میزان شیوع آنها مشخص نیست:

دردهای شکمی، آلورپیسی (ریزش و نازک شدن مو)، یبوست، اسهال، سرگیجه، سوء هاضمه (سوزش معده)، سر درد، اختلال در

عادت ماهانه، تهوع، استفراغ

- هشدارها :

مصرف این دارو می تواند روی نتایج آزمایشات بالینی تاثیر بگذارد.

- تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر (بسته به مقدار داروی مصرفی)، ممکن است تداخلات دارویی بروز نماید:

الکل، داروهای هپاتوتوکسیک، آلپرازولام، دیازپام، میدازولام، تریازولام، داروهای ضد اسید، داروهای آنتی کولینرژیک، داروهای ضد اسپاسم، گیرنده های آنتاگونیست هیستامین، امپرازول، بازدارنده های پمپ پروتون، سوکرافیت ها، داروهای ضد دیابت، آزتیمیزول، ترفنادین، آنرواستاتین، سری واستاتین، لوواستاتین، سیم واستاتین، بوسولفان، دوستاکسل، آکالوئیدهای وینکا، بوسپیرون، داروهای

مسدود کننده کانال کلسیم شامل فلودیپین، نیفدیپین، وراپامیل، کاربامازپین، سیزاپراید، کلاریترومایسین، سیکلوسپورین، سیرولیموس، تاکرولیموس، القا کننده های CYP_{3A4}، مهار کننده های CYP_{3A4}، دیدانوزین، دیگوکسین، دیزوپیرامید، دوفتیلید، کوئینیدین، آلکالوئیدهای ارگوت شامل دی هیدروارگوتامین، ارگوترین، ارگوتامین، اریترومایسین، اینوتیاویر، ریتوناویر، ساکوئیناویر، ایزونیاژید، ریfamپین، لواستیل متادون، فنوباربیتال، فنی توئین، پیموزاید، وارفارین.

- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارو را در ظرف کاملاً در بسته دور از نور و رطوبت نگه داری کنید.
- دارو را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- دوره درمان را کامل کنید.

Reference: - USP DI 2007

تماس مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰

CRM@chemidarou.com