

هر قرص انتریک کوتد حاوی ۲۰ و ۴۰ میلی گرم پنتوپرازول است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
وجود هر نوع حساسیت به پنتوپرازول
وجود نارسائی کبدی .

مصرف مکمل روی (Zn) و یا فرم تزریقی آن و کمبود روی (Zn)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:

بزرگسالان:

- ۱- درمان رفلکس ازوفاگال : ۴۰ میلی گرم در روز تا ۸ هفته پس از آن نیز درمان ممکن است ادامه یابد.
- ۲- عفونت گوارشی ناشی از هلیکوباکترپیلوری: ۴۰ میلی گرم پنتوپرازول همراه با ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین و ۱۰۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین یا ۵۰۰ میلی گرم مترونیدازول ۲ بار در روز تا ۷ روز .
- ۳- زخم معده یا اثنی عشر : ۴۰ میلی گرم در روز تا ۲ هفته در زخم اثنی عشر و ۴ هفته در زخم معده، درمان ممکن است ادامه یابد.

* درمان مصرف در کودکان هنوز به اثبات نرسیده است .

دارو را صبح ها قبل یا بعد از غذا مصرف کنید. از شکستن ، جویدن یا خرد کردن قرص پرهیز کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در مطالعات آزمایشگاهی اثراترأتوژنیک از دارو دیده نشده و از نظر طبقه بندی FDA در گروه B قرار می گیرد. به هر حال در مورد مصرف در دوران بارداری با پزشک مشورت کنید. پنتوپرازول در شیر ترشح می شود و در مورد مصرف یا قطع مصرف آن در دوران شیردهی پزشک تصمیم می گیرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ، عوارض جانبی نیز دارد ، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. عوارض شامل آنافیلاکسی (تغییر در رنگ پوست صورت ، تنفس سریع، نامنظم ، کوتاه یا سخت ، تورم پلک ها ، راش های پوستی ، کهیر و خارش) ، آنژیوداما ، درد قفسه سینه ، گاستروآنژیت ، عفونت ، یرقان ، نوروپاتی بینایی ، پانکراتیت ، اختلالات گفتاری ، سندرم استیون جانسون.

هشدارها:

مصرف این دارو در بیماران مبتلا به کمبود آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز، باید با احتیاط صورت گیرد.

۱- دوره درمان را کامل کنید.

۲- در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کرده اما اگر زمان مصرف دوز بعدی نزدیک است دارو را مصرف نکنید و از دو برابر مصرف کردن دارو خودداری کنید.

۳- علائم بهبود معمولاً پس از ۱ تا ۲ هفته پس از مصرف ظاهر می شوند و بهبود کامل حداقل نیاز به ۴ هفته مصرف دارد.

تداخلات دارویی:

پنتوپرازول منجر به کاهش جذب آمپی سیلین، نمک های آهن و کتوکونازول می شود.
همچنین در زمان مصرف وارفارین باید PT بیمار مرتباً کنترل شود.

مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد توسط بیمار حتماً با یک مرکز مسمومیت تماس بگیرید .
علائم مسمومیت شامل افزایش ضربان قلب ، خواب آلودگی ، گیجی ، سردرد ، تاری دید ، درد شکمی ، تهوع و استفراغ .
در درمان مسمومیت از شستشوی معده و زغال فعال استفاده می شود. درمان علامتی نیز انجام می شود. در صورتیکه بیمار به عمد دارو را زیاد مصرف کرده است او را به مرکز مشاوره روانی ارجاع دهید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

