

برگه راهنمای دارویی

رپاگین (رپاگلیناید) قرص ۰/۵، ۱ و ۲ میلی گرم

Repagain (Repaglinide) Tablet 0.5, 1 and 2 mg

این دارو برای درمان بیماری فعلی تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

-راهنمایهای عمومی:

-قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً داروهای ضد قارچ (کتوکونازول و میکونازول)، داروهای ضد میکروب (اریترومایسین)، ریفامپین، باربیوتورها، کاربامازپین، کلاریترومایسین، جم فیبروزیل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل، کومارینها، پروبنسید، مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز، مهارکننده های گیرنده های بتا، تیازیدها، سایر دیورتیکها، کورتیکواستروئیدها، فنوتیازینها، ترکیبات استروئیدی، استروژنها، کنتراستپتوهای خوراکی، فنی توئین، اسید نیکوتینیک، سمپاتومیمتیکها، مهارکننده های کانالهای کلسیم و ایزونیازید.

-در صورت ابتلاء به سایر بیماریها خصوصاً کتواسیدوز دیابتیک و بیماریهای کبدی.

-علائم هیپوگلیسمی را بشناسید و راه درمان آن را یاد بگیرید.

-مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
در بیمارانی که قبلاً تحت درمان نبوده اند یا آنهایی که مقدار HbA_{1c} کمتر از ۸٪ دارند دوز اولیه مقدار ۰/۵ میلی گرم با هر غذا خواهد بود. در بیمارانی که قبلاً با سایر داروها ی ضد قند خوراکی درمان می شده اند یا کسانی که مقدار HbA_{1c} بزرگتر یا مساوی ۸٪ دارند دوز اولیه ۱ تا ۲ میلی گرم با هر وعده غذا خواهد بود. تنظیم دوز با اندازه گیری قند خون انجام می گیرد. دوز توصیه شده می تواند بین ۴-۰/۵ میلی گرم با هر وعده غذا متفاوت باشد. دوز دارو با نوع غذایی که بیمار مصرف می کند قابل تغییر است. حداکثر دوز توصیه شده این دارو ۱۶ میلی گرم در روز می باشد.

-مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

این دارو از نظر طبقه بندی FDA در رده C می باشد. لذا در دوران بارداری بایستی با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار دارو مصرف شود. این کار باید حتماً با تشخیص و نظر پزشک متخصص باشد. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

-عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض مشاهده شده با مصرف این دارو عبارتند از: افت قند خون، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سینوزیت، رینیت، برونشیت، تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، فقدان ترشح اسید، درد عضلانی، درد کمر، سردرد، پarestزی، درد در قفسه سینه، عفونت دستگاه ادراری، مشکلات در دندانها، آلرژی، آریتمی های خطرناک و ایسکمی قلبی خطرناک.

-مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده ی دارو بلافاصله بیمار را به مرکز فوریت‌های مسمومین انتقال دهید.

-هشدارها:

- ۱- مصرف این دارو به همراه انسولین NPH به هیچ وجه توصیه نمی شود.
- ۲- مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده ی این دارو می تواند باعث ایجاد شوک هیپوگلیسمی شود، لذا به مقدار مصرف دارو توجه کافی داشته باشید.
- ۳- در صورت عدم مصرف وعده غذایی دوز دارو را مصرف نکنید و در صورت اضافه نمودن یک وعده یک دوز دارو اضافه نمایید.
- ۴- در صورت ایجاد شرایط استرس نظیر تب، ضایعات بدنی، عفونتها یا جراحی موضوع را برای تنظیم دوز دارو به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۵- همکاری لازم را برای رعایت رژیم غذایی توصیه شده از جانب پزشک بنمایید. موفقیت درمان شما به مقدار زیادی به این موضوع بستگی دارد.
- ۶- دارو را ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از غذا مصرف کنید.

-تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً داروهای ضد قارچ داروهای ضد میکروب (اریترومایسین)، ریفامپین، باربیوتوراتها، کاربامازپین، کلاریترومایسین، جم فیبروزیل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل، کومارینها، پروبنسید، مهارکننده های مونوآمینواکسیداز، مهارکننده های گیرنده های بتا، تیزیدها، سایر دیورتیکها، کورتیکواستروئیدها، فنوتیازینها، ترکیبات تیروئیدی، استروژنها، کنتراسپتیوهای خوراکی، فنی توئین، اسید نیکوتینیک، سمپاتومیمتیکها، مهارکننده های کانالهای کلسیم و ایزونیازید موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

-شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت درون بسته بندی ارائه شده نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

تماس مشتری: 77141860 (021)

CRM@chemidarou.com