برگه راهنمای دارویی

فاموتیدین قرص روکشدار ۲۰ ، ۴۰ میلی گرم Famotidine F.C. Tablet 20, 40mg

این دارو برای درمان فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

ـ راهنماییهای عمومی :

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید.

۱-۱ وجود هر نوع حساسیت به این دارو و یا سایر داروهای گوارشی مشابه (دارو های دیگر از دسته مهار کننده های گیرنده هیستامین نوع دوم مانند سایمتیدین و...)، موارد دیگر از قبیل غذاها و رنگها و...

۱-۲ سابقه سیروزکبدی، نارسایی کبدی- کلیوی، بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

ـ مصرف در بارداری و شیردهی:

از نظر رده بندی FDA در دوران بارداری در رده B می باشد. این دارو از جفت عبور می کند و مطالعات کافی و کنترل شده از نظر مصرف در دوران بارداری موجود نیست.

این دارو در شیر ترشح می شود.

ـ هشدارها :

۱- طول درمان با دارو را کاملا" رعایت نمائید.

۲-از مصرف ترکیبات الکلی خودداری نمایید.

۳-در صورت مصرف این دارو و عدم بهبودی پزشک خویش را در جریان قرار دهید.

۴-از درمان طولانی مدت (۸ هفته به بالا) بدون نظر پزشک متخصص خودداری نمائید.

۵-در صورت مصرف داروهای زیر فاصله زمانی مصرف را بترتیب زیر تنظیم نمائید.

نام دارو	فاصله مصرف دارو بعد از داروهای زیر
سوکرالفیت	۲ساعت
آنتی اسیدها	۱ – ۰/۵ ساعت
داروهای ضد قارچ	۲ ساعت

۶ - در مصرف طولانی مدت این دارو میزان ویتامین B_{12} باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا این دارو ترشح Intrinsic Factor (فاکتور داخلی) را مورد تاثیر قرار داده که در جذب ویتامین B_{12} نقش اساسی دارد.

۷-برای افرادی که یک بار در روز دارو را مصرف می کنند بهترین دوز یک عدد قرص قبل از خواب است، در صورتی که دستور دارویی آنها ۲ قرص در روز باشد بهتر است یک عدد قرص صبح و یک عدد قبل از خواب میل شود.

ـ مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدارمصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بقرار زیر است :

- بزرگسالان :

۱- درمان :

۱-۱ زخم دوازدهه : ۴۰ میلی گرم موقع خواب یا ۲۰ میلی گرم دوبار در روز

۱-۲ زخم معده : ۴۰ میلی گرم موقع خواب

۳-۱ سوزش سرمعده : ۱۰ میلی گرم در شروع علایم که ممکن است دوز مصرف هر۲۴ ساعت یکبار تکرار شود.

۲- پیشگیری :

۲-۱ زخم دوازدهه : ۲۰ میلی گرم موقع خواب

۲-۲ سوزش سرمعده : ۱۰ میلی گرم قبل از صرف غذا یا نوشیدنی

۲-۳ پنومونی های آسپیراسیون : ۴۰ میلی گرم شب قبل از جراحی

- **کودکان :**

۱- زخم دوازدهه : ۰/۵ mg/kg/day در موقع خواب یا در دو دوز منقسم

۲- رفلاکس معدی – رودی :

۲-۱ : کودکان با وزن بالای ۱۰ کیلوگرم :

۱-۲ mg/kg/day در دو دوز منقسم

۲-۲ : کودکان با وزن کمتر از ۱۰ کیلوگرم :

۱-۲ mg/kg/day در سه دوز منقسم

- حداکثر دوز مصرفی در کودکان ۴۰ mg روزانه
- در بیماران با نارسایی کلیوی (کلیرانس کراتینین کمتر از ۱۰ml/min) مقدار دوز خوراکی به ۲۰ میلی گرم در موقع خواب تعدیل می یابد که می تواند با فواصل هر ۳۶ تا ۴۸ ساعت تکرار شود.

ـ عوارض جانبی :

۱- **عوارضی که در صورت بروز، نیاز به مراقبت پزشکی دارند :**

آریتمی قلبی شامل کاهش ضربان قلب، افزایش ضربان قلب، بلوک دهلیزی- بطنی(گیجی و کاهش سطح هوشیاری، کاهش ضربان قلب، اشکال در تنفس، خستگی و ضعف غیر معمول)، واکنشهای پوستی(شامل راش پوستی، قرمزی پوست، تاول و خارش و ...) تب، عوارض خونی (مشکلات تنفسی، ایجاد زخمهای دهانی، کاهش پلاکت، گلبول سفید خون و ...)، هپاتیت، واکنشهای حساسیتی، ادم ناحیه صورت، لب و پلک، ائوزینوفیلی، راش پوستی، تغییر خلق وخوی، واسکولیت، اضطراب، گیجی، هالوسیناسیون، درد عضلانی اگرانولوسیتوز (تب، گلودرد، خستگی غیر عادی و ضعف)، درد مفاصل، ضعف، برونکواسپاسم، خستگی عضلانی، طپش سریع قلب

۲- **عوارضی که در صورت استمرار، نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

واکنش های حساسیتی، درد شکمی، آلوپسی، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، خشکی پوست، بیخوابی، تهوع، وزوزگوش، استفراغ

– تداخلات دارویی:

آنتی اسیدها، ایتراکونازول و کتوکونازول

ـ مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و یا مشاهده عـــوارض به شکل شدیـــد و یا حالت کما، درمان متوقف و هرچه سریعتر مسموم را به بیمارستان برسانید.

ـ شرایط نگهداری :

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تماس مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰
CRM@chemidarou.com