برگه راهنمای دارویی

لورازپام قرص خط دار ۱ ، ۲ میلی گرم Lorazepam Scored Tablet 1, 2mg

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

ـ راهنمایی های عمومی :

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید.

۱-۱ وجود هر نوع حساسیت به دارو یا سایر بنزودیازپین ها، مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگها و ...

۱-۲ سابقه مصرف داروهای دیگر بخصوص تضعیف کننده های سیستم عصبی مرکزی، ایتراکونازول، کتوکونازول و نفازودون.

۱-۳ سابقه تشنج یا حملات صرعی، وجود گلوکوما با زاویه باز، نارسایی کبدی، پرتحرکی، هیپوآلبومینمیا، دپرسیون عقلی، میاستنی گراویس، اختلالات مغزی، پورفیریا، وجود سایکوز، انسداد مزمن و شدید تنفسی، نارسایی کلیوی، مشکل بلع در کودکان، مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتی ضعیف شده و آپنه تنفسی.

۱-٤ از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

ـ مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

از نظر طبقه بندی FDA این دارو در دوران بارداری رده D می باشد . گزارش شده است مصرف در نیمه اول بارداری منجر به بروز مشکلات ژنتیکی می گردد. مصرف مزمن در دوران بارداری منجر به بروز وابستگی فیزیکی و ایجاد سندرم قطع دارو می شود و در هفته آخر بارداری منجر به افسردگی و ضعف در نوزاد می شود .

در دوران شیردهی این دارو در شیر ترشح می شود و مشکلات تغذیه ای، خواب آلودگی و کاهش وزن در نوزاد ایجاد می کند.

ـ هشدارها :

۱- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا در طول درمان با آن از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

۲- در کوما و شوک با احتیاط مصرف شود.

۳- مصرف در بیماران با گلوکوم حاد با زاویه بسته منع شده است.

۴ - به منظور کاهش احتمال بروز عوارض قطع مصرف دارو ، مصرف این دارو باید به تدریج قطع گردد.

۵ - در صورتیکه دارو بعد از چند هفته موثر نبود دوز را افزایش ندهید و با پزشک تماس بگیرید.

۶ - نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود.

۷- بعنوان ضد تشنج دوره درمان باید کامل شود و باید دقت شود هیچیک از نوبتهای مصرف فراموش نشود.

۸- در صورت بروز هر گونه تغییر در رفتار پزشک خود را در جریان بگذارید.

ـ مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان :

- ضد اضطراب : ۳-۱ میلی گرم ۳-۲ بار در روز در افراد ناتوان شروع با ۲- ۰/۵ میلی گرم بصورت منقسم با افزایش تدریجی در حد نیاز

- خواب آور- آرامبخش : ۴-۲ میلی گرم بصورت یک دوز واحد هنگام خواب.

افراد مسن و ناتوان ممکن است به دوز پائین نیاز داشته باشند.

کودکان : ایمنی و اثربخشی این دارو بعنوان ضد اضطراب و خواب آور – آرام بخش در کودکان کمتر از ۱۲ سال ثابت نشده است.

سالخوردگان : شروع با ۲ – ۰/۵ میلی گرم بصورت منقسم با افزایش تدریجی در حد نیاز .

- عوارض جانبی :

ایجاد وابستگی فیزیکی و روانی و تحمل به دارو بخصوص با دوز بالا و به مدت طولانی . کودکان با سن کم و بیماران سالخورده و بیماران با نارسایی کبدی به اثرات این دارو بر سیستم عصبی مرکزی بیشتر حساس می باشند.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- با شیوع کم:

فراموشی، اضطراب ، تیرگی شعور، دپرسیون مغزی، تاکی کاردی و طپش سریع قلب

- بندرت :

افکار غیر عادی ، اختلالات شخصیتی، عدم درک موقعیت مکانی و زمانی، واکنش های آلرژیک، تغییر رفتاری، دیسکرازی خونی شامل اگرانولوسیتوز، آنمی، لوکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، اثرات اکستراپیرامیدال، حرکات غیر ارادی بدن، نارسایی کبدی، ضعف عضلانی، واکنش پارادوکسیکال شامل لرزش، رفتار تهاجمی بروز خشونت، هالوسیناسیون، بی خوابی و هیجان غیرعادی

عوارضی که در صورت ادامه داشتن و یا ایجاد زحمت نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- با شیوع زیاد:

آتاکسی، منگی و گیجی، خواب آلودگی و اختلال در تکلم

- با شیوع کم و یا به ندرت :

کرامپ های شکمی یا معده، تاری دید یا تغییر در دید، تغییر در میل جنسی، یبوست، اسهال، خشکی دهان، افوریا، سردرد، افزایش ترشحات برونش ها یا ترشح زیاد بزاق، اسپاسم عضلانی، تهوع و استفراغ، مشکل در ادرار، لرزش یا خستگی یا ضعف غیر معمول .

عوارضی که ممکن است در اثر قطع دارو بروز کند و نیازمند مراقبت پزشکی هستند :

- با شیوع زیاد:

بیخوابی، عصبانیت و تحریک پذیری

- با شیوع کم :

کرامپ های شکمی یا معده، تیرگی شعور، دپرسیون، افزایش تعرق، کرامپ عضلانی، تهوع و استفراغ، شامل افزایش حساسیت به درد و یا لمس، پارستزی، نورترسی، حساسیت به صدا، تاکیکاردی، لرزش و اختلال شخصیتی

- به ندرت :

تشنج، هذیان، هالوسیناسیون و علائم پارانوئید.

– تداخلات دارویی و اثر بر پاسخ تست های آزمایشگاهی :

ایتراکونازول، کتوکونازول، الکل، داروهای تضعیف کننده سیستم عصب مرکزی، فلووکسامین، نفازودون، آنتی اسیدها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، کاربامازپین، سایمتیدین، ضد بارداری های خوراکی حاوی استروژن، دیلتیازم، دی سولفیرام، اریترومایسین، فلوکستین، عصاره میوه گریب فرویت، پروپوکسی فن، رانیتیدین، وراپامیل، کلوزاپین، مشتقات فنتانیل، داروهای کاهنده فشار خون، ایزونیازید، لوودوپا، امپرازول، پروبنسید، ریفامپین، اسکوپولامین و زیدوودین .

این دارو ممکن است در نتایج تست های آزمایشگاهی زیر ایجاد تداخل نمائید.

۱-۱ - Metyrapone Test

۱-۲- Sodium iodideI 123 Test

۱-۳- Sodium iodide I 131 Test

_ مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و یا مشاهده عوارض به شکل شدید و یا حالت کما، درمان متوقف و هرچه سریعتر مسموم را به بیمارستان برسانید.

_ شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت درون جعبه، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

Ref : USP DI 2007

تماس مشتری : ۷۷۱۴۱۸۶۰-۰۲۱

CRM@chemidarou.com