قرص خوراکی

تایلانول® (استامینوفن) ۵۰۰ میلی‌گرم

Oral Tablet

Tylanol® (Acetaminophen) 500 mg

هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری و شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولیکن دوز معمول این دارو بصورت زیر است:
- **بزرگسالان و افراد بالاتر از ۱۲ سال برای تب و درد:** ۵۰۰ میلی‌گرم تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت، حداقل فاصله دوزها: هر ۴ ساعت، ماکزیمم دوز در هر بار مصرف: ۱۰۰۰ میلی‌گرم، ماکزیمم دوز در روز: ۴۰۰۰ میلی‌گرم.
- در کودکان کمتر از ۱۲ سال نباید مصرف شود.

منع مصرف:

حساسیت به استامینوفن، مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، نارسایی کبدی شدید یا بیماری کبد اکتیو شدید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
این دارو معمولا عارضه جانبی خاصی ایجاد نمی‌کند اما به صورت نادر:

آگرانولوسیتوز (تب با یا بدون لرز، زخم یا لکه‌های سفید روی لب یا داخل دهان، گلودرد)، **کم خونی** (ضعف و خستگی غیر عادی)، **درماتیت آلرژیک** (بثورات جلدی، کهیر، خارش)، **هپاتیت** (زرد شدن پوست یا چشم)، **کولیک کلیوی** (احساس درد شدید در پایین کمر)، **نارسایی کلیوی** (کاهش ناگهانی در مقدار ادرار)، **پیوری استریل** (ادرار تیره)، **ترومبوسیتوپنی** (کبودی یا خونریزی غیرمعمول، مشاهده خون در ادرار یا مدفوع یا سیاه شدن مدفوع، لکه‌های قرمز کوچک روی پوست).

هشدار:

۱- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به کمبود آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز، باید با احتیاط صورت گیرد.
۲- مصرف بیش از حد مجاز روزانه این دارو ممکن است سبب آسیب کبدی شدید شود.
۳- در صورت مصرف این دارو و بروز واکنش‌های پوستی، مصرف دارو بلافاصله قطع گردد.
۴- مصرف این دارو در افراد با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم یا مبتلا به سوء تغذیه مزمن، نارسایی شدید کلیه و کبد و دهیدراتاسیون مزمن و یا مصرف کننده الکل با احتیاط صورت گیرد.
۵- در صورت بروز واکنش‌های آنافیلاکتیک و بیش حساسیتی مصرف دارو بلافاصله قطع گردد.
۶- این دارو با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و یا سالیسیلات به طور همزمان بیش از چند روز استفاده نشود.

در موارد زیر با پزشک مشورت شود:

۱- اگر این دارو را برای تسکین درد استفاده می‌نمایید و درد بیشتر از ۱۰ روز ادامه یابد و یا بدتر شود و یا آن که علایم جدید و قرمزی یا تورم ناحیه درد ایجاد شود.

۲- اگر این دارو را برای کاهش تب استفاده می‌نمائید و تب بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و یا بدتر شود و یا آنکه علایم جدید ایجاد شود.

۳- اگر این دارو را برای گلودرد استفاده می‌نمائید و گلودرد بسیار دردناک شود و بیشتر از ۲ روز ادامه یابد و یا با تب، سردرد، راش، تهوع یا استفراغ همراه شود.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید.

باربیتورات‌ها، بوسولفـــان، کاربامازپین، کلستیرامین، داپسون موضعی، فنی توئین، ایماتینیب، داســـاتینیب، ایزونیازید، لاموتریژین، فنیل افرین، متی‌راپون، پریلوکائین، پروبنسید، نیتریک اکساید، سدیم نیتریت، سورافنیب، آنتاگونیست‌های ویتامین کا مانند وارفارین، داروهای ضد صرع تحریک کننده آنزیم.

شرایط نگهداری:

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت و داخل جعبه نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۶

شـــرکت صنعتـــی کیمیـدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰

کیمیدارو
شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران