قطره خوراکی

تایلانول® (استامینوفن) ۱۰۰ میلی‌گرم

Oral Drops

Tylanol® (Acetaminophen) 100 mg

هر شیشه قطره خوراکی ۱۰۰ میلی‌گرم استامینوفن است.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

۱- وجود هرنوع حساسیت به دارو و یا اسید استیل سالیسیلیک (آسپیرین)، مواد غذایی و رنگ‌ها

۲- نارسایی کلیوی

۳- نارسایی کبدی

۴- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

۵- وجود آسم یا تنگی نفس

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است :

ضد درد و ضد تب : ۱/۵ گرم به ازاء هر متر مربع سطح بدن در دوزهای منقسم یا برای

نوزادان تا ۳ ماه : ۴۰ میلی‌گرم (معادل ۰/۴ میلی لیتر یا ۱۰ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

نوزادان ۴ تا ۱۲ ماه : ۸۰ میلی‌گرم(معادل ۰/۸ میلی لیتر یا ۱۹ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۱ تا ۲ سال : ۱۲۱ میلی‌گرم(معادل ۱/۲ میلی لیتر یا ۲۸ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۲ تا ۴ سال : ۱۶۰ میلی‌گرم(معادل ۱/۶ میلی لیتر یا ۳۷ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۴ تا ۶ سال : ۲۴۰ میلی‌گرم(معادل ۲/۴ میلی لیتر یا ۵۶ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۶ تا ۹ سال : ۳۲۰ میلی‌گرم(معادل ۳/۲ میلی لیتر یا ۷۴ قطره) هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۹ تا ۱۱ سال : ۳۲۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در صورت نیاز

کودکان ۱۱ تا ۱۲ سال : ۳۲۰ تا ۴۸۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در صورت نیاز

توجه :

۱- توصیه می شود که اگر با وجود مصرف استامینوفن، درد در عرض ۵ روز، تب در عرض ۳ روز و گلودرد در عرض ۲ روز بهبود پیدا نکرد حتماً با پزشک مشورت کنند.

۲- در کودکان تا سن ۲ سال دوز دارو حتما با مشورت پزشک تعیین گردد.

بهتر است تا دوز مصرف بر حسب وزن کودکان تعیین شود در غیر اینصورت به شکل فوق و برحسب سن تعیین می گردد.

با توجه به اینکه این دارو حاوی متیل پارابن است در نوزادان زیر ۲ ماه (بدلیل ریسک کرنیکتروس) با احتیاط مصرف شود.

با توجه به اینکه این فرآورده حاوی پروپیل پارابن است، ایمنی پروپیل پارابن در کودکان زیر ۲ سال اثبات نشده است.

مصرف در بارداری و شیر دهی :

منافع مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی باید در برابر مضار آن سنجیده شود.

عوارض جانبی:

مواردی که نادر بوده ولی در صورت بروز نیاز به توجه‌هات پزشکی دارند :

– کدورت یا خون آلود شدن ادرار، دفع دردناک ادرار، کاهش مقدار ادرار

– بثورات جلدی، کهیر، خارش

– گلودرد، تب، خونریزی یا کبودی غیر عادی
– زرد شدن پوست و چشم ها
– ضعف و خستگی غیر عادی

هشدارها :

۱- افراد زیر ۱۲ سال بیش از ۵ دوز در ۴۲ ساعت نباید مصرف کنند مگر به تشخیص پزشک .
۲- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده و یا مصرف طولانی مدت احتمال ایجاد آسیب کبدی وجود دارد.
۳- مصرف طولانی مدت و مداوم در بیماران با نارسایی شدید کبد و کلیه.
۴- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده حتی بدون علایم به پزشک مراجعه کنید.
۵- در صورت مصرف سایر داروها که حاوی استامینوفن می باشد خطر مسمومیت وجود دارد.

مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده حتی بدون بروز علایم بیمار را فورا به بیمارستان منتقل کنید.

تداخلات دارویی:

مصرف مزمن و یا دوز های بالای استامینوفن می توانند با موارد زیر ایجاد تداخل کنند :
القا کننده های آنزیم کبدی، دارو های ایجاد کننده سمیت کبدی، دارو های ضد انعقاد، دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (آسپرین و ...) و بیماران مصرف کننده الکل بصورت مزمن.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران

شرکت صنعتی کیمیدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰